

Matematická analýza pro učitele
(text je v pracovní verzi)

Martina Šimůnková

12. října 2023

Obsah

1	Úvod	7
1.1	Co je to funkce	7
1.1.1	Od předpisu funkce k jejímu grafu	7
1.1.2	Od grafu k předpisu funkce	8
1.1.3	Další terminologie	10
1.2	Co budeme na funkcích zkoumat	11
1.2.1	Příklady na přírůstek funkce	11
1.2.2	Shrnutí	12
1.3	Spojitosť funkce	13
1.4	Odstranitelná nespojitost	14
1.4.1	Příklad	14
1.4.2	Další příklad	15
1.4.3	Méně intuitivní příklad	16
1.4.4	Shrnutí	17
1.5	Limita funkce	18
1.5.1	Nevlastní limity, jednostranné limity	18
1.6	Aproximace funkcí	20
1.6.1	Aproximace polynomem	20
1.7	Derivace	22
1.8	Nekonečně malé veličiny	25
1.8.1	Přednášky Zbyňka Kubáčka	26
1.9	Software na kreslení grafů	26
1.10	Elementární funkce	27
2	Příklady na čtení z grafu	31
2.1	Geometrické úlohy	31
2.1.1	Úlohy k řešení	31
2.1.2	Řešený příklad	34

2.2	Sbírka úloh <i>Matematika a svět okolo nás</i>	38
3	Čísla	41
3.1	Racionální čísla	41
3.2	Vlastnosti reálných čísel	42
3.3	Další vlastnosti reálných čísel	45
3.4	Supremum, infimum	48
4	Aritmetika a funkce	51
4.1	Mocniny s přirozeným exponentem	51
4.1.1	Grafy mocninných funkcí	51
4.1.2	Sudost, lichost	52
4.1.3	Monotonie	53
4.1.4	Obor hodnot	54
4.1.5	Spojitosť	56
4.1.6	Mocninná funkce na racionálních číslech	56
4.1.7	Reálná čísla a odmocnina	57
4.2	Odmocniny	58
4.3	Inverzní funkce	59
4.3.1	Odmocnina jako inverzní funkce	59
4.4	Polynomy	61
4.5	Racionální funkce	62
5	Cvičení na funkce a jejich grafy	63
5.1	Rovnice s parametrem	63
5.1.1	Grafické řešení rovnice s parametrem	64
5.1.2	Početni řešení rovnic s parametrem	64
5.2	Další příklady na rovnice s parametrem	66
5.2.1	66
5.2.2	68
5.3	Limity	69
5.4	Další příklady na rovnice s parametrem	72
5.4.1	72
5.4.2	72
6	Dodatek – rovnice přímky, přímá úměra	77
6.1	Motivační úlohy	77
6.1.1	Přímá úměra	77

<i>OBSAH</i>	5
6.1.2 Podobnost trojúhelníků	78
6.1.3 Objem komolého kužele	79
6.1.4 Lineární interpolace	81
6.1.5 Převod stupňů Celsia na stupně Fahrenheita	84
6.1.6 Sečna, tečna a Lagrangeova věta o střední hodnotě	85
6.1.7 Shrnutí	87
6.2 Rovnice přímky	87
6.3 Geometrický význam koeficientů	90
6.4 Graf lineární funkce	91
Rejstřík	94

Kapitola 1

Úvod

V textu se budeme zabývat *funkcemi* jedné reálné proměnné. V této úvodní kapitole vyložíme, co to funkce je, a nastíníme, co všechno nás na funkcích bude zajímat.

1.1 Co je to funkce

Historicky byla funkce předpis, např. $f(x) = x^2$. Dnes pod pojmem funkce rozumíme závislost mezi dvěma proměnnými, která může, ale nemusí být dána jedním předpisem. Tyto stručné historické poznámky čerpáme z [2], 4.4.7, zvědavý čtenář tam najde další podrobnosti.

1.1.1 Od předpisu funkce k jejímu grafu

Funkce zadané (jediným) předpisem nazýváme *elementárními funkcemi*. Zkoumání těchto funkcí bude jedním z našich cílů, ale nikoliv jediným.

Příkladem funkcí zadaných jinak než jedním předpisem jsou funkce f , g ,


$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & x < 1 \\ x/2 & x \geq 1 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & x < 1 \\ x & x \geq 1 \end{cases} \quad (1.1)$$

Dirichletova funkce δ

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

nebo funkce zadané empiricky jako například průběh teploty naměřené meteorologickou stanicí v závislosti na čase.

Důležitým pojmem je *graf funkce*. Na obrázku jsou grafy funkcí z (1.1).



Grafem Dirichletovy funkce jsou dvě „řídke“ přímky.

Ve výše uvedených příkladech jsme předpokládali, že čtenář ví, co je graf funkce. Napišme jeho definici – nejdříve slovy a níže pomocí matematických symbolů: Graf je podmnožina roviny, přitom body v rovině popisujeme pomocí souřadnic – dvojic reálných čísel $[x, y]$. Graf funkce f je pak množina G , která obsahuje dvojice $[x, y]$ splňující: x je prvkem definičního oboru funkce f ; y je rovno funkční hodnotě $f(x)$. Pomocí matematických symbolů graf zapíšeme

$$G = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x \in D(f) \wedge y = f(x)\}$$

Množinu všech dvojic – kartézský součin $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ jsme označili zkráceně \mathbb{R}^2 , definiční obor jsme označili $D(f)$. Konjunkci \wedge (a zároveň) často nahrazujeme v zápise čárkou:

$$G = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x \in D(f), y = f(x)\}$$

1.1.2 Od grafu k předpisu funkce

Někdy se funkce definuje primárně jako její graf, tedy množina dvojic reálných čísel $[x, y] \in \mathbb{R}^2$ taková, že k číslu x leží na tomto grafu maximálně jeden bod $[x, y]$. Jinak řečeno, leží-li body $[x, y_1], [x, y_2]$ na grafu funkce, musí platit $y_1 = y_2$. Formálně zapsáno $G \subset \mathbb{R}^2$ je grafem funkce, pokud platí


$$(\forall x, y_1, y_2 \in \mathbb{R})(([x, y_1] \in G \wedge [x, y_2] \in G) \Rightarrow y_1 = y_2).$$

Čteme: pro každou trojici reálných čísel x, y_1, y_2 z platnosti $[x, y_1] \in G, [x, y_2] \in G$ vyplývá $y_1 = y_2$.

Rozmyslete si, že bez implikace (tj. bez použití slova vyplývá) lze tvrzení zformulovat: pro každou trojici reálných čísel x, y_1, y_2 splňujících $[x, y_1] \in G$, $[x, y_2] \in G$ platí $y_1 = y_2$.

Teprve z grafu funkce je poté odvozen předpis a definiční obor funkce. Číslu $x \in \mathbb{R}$ přiřadíme číslo y splňující $[x, y] \in G$. Definičním oborem je množina čísel x , pro něž existuje číslo y takové, že $[x, y] \in G$.

Vysvětlíme na následujících grafech.



Budeme procházet obrázky zleva doprava.

1. Na obrázku je čtvrtkružnice, která je grafem funkce s definičním oborem $D = [0, 1]$. Předpis funkce dostaneme z rovnice kružnice $x^2 + y^2 = 1$ vyjádřením $y = \pm\sqrt{1-x^2}$. V prvním kvadrantu je $y \geq 0$ a tedy dostáváme předpis $y = \sqrt{1-x^2}$.
2. Půlkružnice na obrázku není grafem funkce. Její rovnice je $x^2 + y^2 = 1$, $x \in [0, 1]$. Pro $x \in [0, 1)$ půlkružnice obsahuje dva různé body $[x, \sqrt{1-x^2}]$, $[x, -\sqrt{1-x^2}]$.
3. Křivka na třetím obrázku je větev hyperboly o rovnici $y = 1/x$. Na obrázku je vidět jen její část, ale uvažujme ji jako graf funkce celou. Definiční obor této funkce je $D = (0, +\infty)$.
4. Na obrázku je graf po částech konstantní funkce s definičním oborem $(a, b) \cup (b, c)$. Jiným způsobem můžeme tento obor zapsat $(a, c) \setminus \{b\}$.¹
5. Na obrázku tvoří graf funkce čtyři body. Definiční obor funkce je čtyřprvková množina $\{a, b, c, d\}$.

Úkol. Uveďte další příklady funkcí jak elementárních, tak ostatních. Nejlépe takové, které popisují závislost fyzikálních, geometrických, případně jiných „reálných“ veličin. Dále uveďte příklady množin $G \subset \mathbb{R}^2$ a určete, zda jsou grafem funkce a případně určete definiční obor a předpis funkce.

¹První způsob je sjednocení dvou otevřených intervalů, druhý je rozdíl intervalu a jednoprvkové množiny.

1.1.3 Další terminologie


Výše mluvíme o funkci jako vztahu dvou proměnných. Jednu z proměnných zpravidla označujeme x a nazýváme ji *argumentem* funkce, *proměnnou* funkce, *vzorem* a ve středoškolských učebnicích zpravidla nezávisle proměnnou. Druhou proměnnou zpravidla označujeme y nebo $f(x)$ (pro funkci pojmenovanou f) a nazýváme ji *funkční hodnotou*, *obrazem* a ve středoškolských učebnicích zpravidla závisle proměnnou. Pokud mají proměnné nějaký význam, třeba geometrický (délka, obsah, souřadnice, ...) nebo fyzikální (čas, rychlost, síla, teplota, ...), často použijeme místo x , y značení dané veličině odpovídající. Například označíme čas t , vzdálenost s a $s = 1/2gt^2$ je závislost dráhy na čase při pohybu v gravitačním poli intenzity g . Nebo označíme délku hrany krychle a , objem krychle V a $V = a^3$ je závislost objemu na délce hrany.

Pojmy (termíny) *vzor* a *obraz* znáte z geometrie při zobrazování (posunutí, otočení, zrcadlení). Funkce je speciálním typem zobrazení, kde vzory a obrazy jsou čísla.

1.2 Co budeme na funkcích zkoumat

Bude nás zajímat změna funkční hodnoty při změně proměnné. Vysvětlíme na příkladech.

1.2.1 Příklady na přírůstek funkce



Příklad. Obsah čtverce o straně a je roven $O = a^2$. Změnou velikosti strany o Δa dostaneme obsah $(a + \Delta a)^2$, po úpravě

$$(a + \Delta a)^2 = a^2 + 2a\Delta a + (\Delta a)^2$$

Jednotlivé sčítance vidíme na obrázku jako obsahy dvou obdélníků o stranách a , Δa a čtverce o straně Δa . Obsah čtverce se změní o

$$\Delta O = 2a\Delta a + (\Delta a)^2$$

Příklad. Uvažujme těžký předmět o hmotnosti m , který působí silou $F = mg$ na podložku o obsahu O . Tlak této podložky na její podloží je $p = F/O$. Vypočteme, jak se změní tlak při změně obsahu podložky. Přitom uvažujeme pouze váhu předmětu, proto je síla F konstantní, změnu váhy desky zanedbáme. Tlak se změní na


$$\frac{F}{O + \Delta O}$$

Chceme-li spočítat změnu tlaku, odečteme od sebe novou a starou hodnotu a upravíme

$$\frac{F}{O + \Delta O} - \frac{F}{O} = \frac{FO - (O + \Delta O)F}{O(O + \Delta O)} = \frac{FO - OF - \Delta OF}{O(O + \Delta O)} = \frac{-F\Delta O}{O(O + \Delta O)}$$


Vidíme, že kladné hodnotě ΔO odpovídá záporná změna tlaku, tedy vlastně pokles tlaku. To odpovídá fyzikální představě – při rozložení váhy na větší plochu se tlak zmenší.

Ukážeme, jak se výše uvedené zobrazí na grafech funkcí.



Na grafu funkce $O = a^2$ je znázorněna změna proměnných a , O .


Číslo Δa budeme nazývat *přírůstkem proměnné a* , číslo ΔO *přírůstkem funkce* (přesnější by asi bylo říkat *přírůstek funkční hodnoty*, ale moc se to nepoužívá).



Na grafu funkce $p = F/O$ je znázorněna změna proměnných O , p .

Zde je funkce klesající a tedy *přírůstek funkce Δp* je záporný.

Zatím jsme uvažovali kladný *přírůstek proměnné*. Na následujícím obrázku je *přírůstek proměnné Δa* záporný, což odpovídá zmenšení strany čtverce. Protože je funkce $O = a^2$ rostoucí, tak je záporný i *přírůstek funkce ΔO* .




1.2.2 Shrnutí

Na příkladech jsme vysvětlili pojmy *přírůstek proměnné* a *přírůstek funkce*. V dalších kapitolách budeme pracovat s těmito pojmy a se vztahy mezi nimi.

1.3 Spojitost funkce

K vyložení pojmu *spojitost funkce* si připomeňme funkce f, g z kapitoly 1.1.1 a jejich grafy, do kterých dokreslíme přírůstek proměnné Δx a přírůstek funkce Δy .



Pojem spojitosti se vyvíjel, kdysi byly obě funkce f, g považovány za nespojité v bodě $x = 1$, protože se v tomto bodě mění funkční předpis.²


V současné době chápeme pojem spojitosti funkce jinak a vycházíme ze vztahu přírůstků. V případě funkce g „malým“³ hodnotám Δx odpovídají „malé“ hodnoty Δy . V případě funkce f je tomu stejně pro kladné Δx , ale pro záporné Δx je tomu jinak: „malému“ Δx odpovídá Δy , které je větší než 0.5.

Podle současné definice spojitosti není funkce f v bodě $x = 1$ spojitá zatímco funkce g ano. Přesná definice pojmu spojitosti je poměrně obtížná a uvedeme ji později.

Dalším příkladem nespojité funkce je zaokrouhlovací funkce. Čísla do 0.5 zaokrouhlíme dolů na nulu. Čísla od 0.5 do 1.5 zaokrouhlíme na jedničku, atd. . . . Grafem této zaokrouhlovací funkce jsou úsečky a body nespojitosti funkce jsou 0.5, 1.5, atd. . . .

²Čerpáme z poznámek 4.4.7 z [2] jež jsme již zmínili výše.

³Úvozovkami chceme zdůraznit značnou vágnost, nepřesnost, pojmu „malý“.



1.4 Odstranitelná nespojitost

Odstranitelnou nespojitost vysvětlíme na příkladech. Začneme jednoduchým příkladem funkce, u které lze zkrácením zlomku rozšířit definiční obor. Další příklady budou obtížnější a méně intuitivní. V závěru poznatky shrneme a definujeme pojem odstranitelné nespojitosti.

1.4.1 Příklad

Nakreslíme graf funkce f

$$f(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x} \quad (1.2)$$

Definiční obor jsou $x \in \mathbb{R}$, pro něž má výraz smysl, tedy všechna kromě jedničky. Výraz v čitateli lze rozložit na součin a poté pro $x \neq 1$ pokrátit se jmenovatelem


$$\frac{1 - x^2}{1 - x} = \frac{(1 - x)(1 + x)}{1 - x} = 1 + x$$

Grafem tedy bude přímka o rovnici $y = 1 + x$ bez jednoho bodu.

Přidáním bodu $[1, 2]$ do grafu funkce dostaneme graf funkce $\tilde{f}(x) = 1 + x$. Funkce f , \tilde{f} se liší definičním oborem: zatímco definiční obor \tilde{f} je množina reálných čísel,⁴ tak definiční obor funkce f je množina reálných čísel bez bodu 1 .⁵

⁴Pomocí matematických symbolů zapíšeme: $D(\tilde{f}) = \mathbb{R}$, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

⁵Bodem máme na mysli bod na ose x . Běžně budeme mluvit o chování funkce v bodě – spojitosti v bodě, limitě v bodě, tečně v bodě. Bod v rovině má dvě souřadnice a například



Čím se funkce neliší, jsou funkční hodnoty v bodech průniku obou definičních oborů. Funkci f_1 splňující

$$D(f_1) \supseteq D(f_2),^6 \quad \forall x \in D(f_2) : f_1(x) = f_2(x)^7$$

budeme nazývat *rozšířením funkce* f_2 . Funkce \tilde{f} je tedy rozšířením funkce f . Graf \tilde{f} je přímka.

Pokud bychom přidali jiný bod, například $[1, 1]$, dostali bychom funkci \hat{f} , jejíž předpis vidíte níže.

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 1 + x & x \neq 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases} \quad (1.3)$$

Funkce \tilde{f} , \hat{f} jsou obě rozšířením funkce f . Funkce \tilde{f} je navíc v bodě, ve kterém jsme funkci f rozšiřovali, spojitá, proto ji nazýváme *spojitým rozšířením funkce* f .

1.4.2 Další příklad

Dalším příkladem je funkce

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$


v případě tečny běžně mluvíme o tečně v bodě x_0 a z geometrického hlediska má tečný bod souřadnice: $[x_0, f(x_0)]$.

⁶Čtete: $D(f_1)$ je nadmnožinou $D(f_2)$, případně: $D(f_2)$ je podmnožinou $D(f_1)$.

⁷Čtete: pro všechna x z $D(f_2)$ platí $f_1(x) = f_2(x)$, případně: pro všechna x z definičního oboru funkce f_2 jsou si funkční hodnoty x funkcí f_1 , f_2 rovny.

Na obrázku vidíte graf, hodnoty sinu počítáme v radiánech. Funkce není definovaná v nule. Můžeme ji v nule spojitě rozšířit hodnotou jedna⁸

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$



1.4.3 Méně intuitivní příklad

K objasnění pojmu spojitost uvedeme méně intuitivní příklad funkcí f , g , jejichž předpisy vidíte níže.

$$f(x) = \sin(1/x), \quad g(x) = x \sin(1/x)$$

Kořeny⁹ těchto funkcí získáme z rovnice

$$1/x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ze které vyjádříme x


$$x = \frac{1}{k\pi}$$

kořeny jsou tedy v bodech $1/\pi$, $1/(2\pi)$, $1/(3\pi)$, $1/(4\pi)$, $1/(5\pi)$, ... a mezi nimi jsou vždy body $1/(1.5\pi)$, $1/(2.5\pi)$, $1/(3.5\pi)$, $1/(4.5\pi)$, ve kterých funkce

⁸Proč zrovna hodnotou jedna si ukážeme později, souvisí to s použitím radiánů. Při použití stupňů bychom dostali hodnotu $\pi/180 \doteq 0.017$.

⁹Kořenem funkce f nazýváme kořen rovnice $f(x) = 0$. Kořenům odpovídají na grafu jeho průsečíky s osou x .

g nabývá hodnoty 1, nebo -1 a funkce h hodnoty x , nebo $-x$. Grafy tedy velmi rychle kmitají v okolí nuly. Na grafu jsou tečkovaně znázorněny přímky $y = x$, $y = -x$.



V bodě $x = 0$ tyto funkce nejsou definované. Pokud chceme, můžeme je v tomto bodě rozšířit. Vzniknou tím nové funkce, které označíme \hat{f} , \hat{g} .

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \hat{g}(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad (1.4)$$

Pojďme rozebrat, jestli jsou tato rozšíření spojitá.

Protože pro hodnoty x „blízké“ nule jsou hodnoty $\hat{g}(x)$ „blízké“ $\hat{g}(0)$, je funkce \hat{g} spojitá v bodě nula. Funkce \hat{g} je tedy spojitým rozšířením funkce g .

Funkce \hat{f} nabývá v bodě 0 hodnoty $\hat{f}(0) = 0$ a pro hodnoty x „blízké“ nule nabývá hodnot až jedna a mínus jedna (ve výše zmiňovaných bodech $1/(1.5\pi)$, $1/(2.5\pi)$, $1/(3.5\pi)$, $1/(4.5\pi)$, ...). Proto není funkce \hat{f} spojitá v bodě nula a je sice rozšířením funkce f , ale není jejím spojitým rozšířením.

1.4.4 Shrnutí

K pojmu spojitost ještě uvedeme, že elementární funkce (tedy funkce zadané jedním funkčním předpisem, které znáte ze střední školy) jsou na svých de-

finičních oborech spojité. Příklady nespojitých funkcí tedy můžeme dostat jen v případě funkcí definovaných více vztahy.¹⁰

Pokud funkce není v bodě x_0 spojitá, ale lze ji v tomto bodě spojitě rozšířit, říkáme, že má funkce v bodě x_0 *odstranitelnou nespojitost*. V této kapitole jsme uvedli příklady odstranitelných nespojitostí: funkce f definovaná v (1.3) má odstranitelnou nespojitost v bodě $x = 1$ a funkce g definovaná v (1.4) má odstranitelnou nespojitost v bodě $x = 0$.

1.5 Limita funkce

S pojmem spojitosti úzce souvisí pojem limita. Například funkce $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ zmiňovaná výše není definovaná v bodě $x = 1$, ale má v tomto bodě limitu rovnou $\hat{f}(1) = 2$. Zjednodušeně to znamená, že pro x blízké jedné je $f(x)$ blízké dvěma.

Dalším příkladem funkce mající limitu je výše zmiňovaná funkce $g(x) = x \sin(1/x)$. V bodě nula má limitu rovnou nule.

Příklad funkce nemající limitu je $f(x) = \sin(1/x)$ v bodě nula. Vysvětlíme proč: pro velká $k \in \mathbb{N}$ jsou obě $x_+ = 1/(\pi/2 + 2k\pi)$ a $x_- = 1/(-\pi/2 + 2k\pi)$ „hodně blízko“ nule a zároveň je $f(x_+) = \sin(1/x_+) = 1$ a $f(x_-) = \sin(1/x_-) = -1$. Neexistuje tedy žádné reálné číslo, kterému by byly hodnoty $f(x)$ „blízké“ pro „všechna x blízka“ nule.

Další výše zmiňovaná funkce $f(x) = (\sin x)/x$ má v nule limitu. Hodnota limity závisí na jednotkách, které zvolíme pro výpočet sinu. Oblouková míra (radiány) se vyznačuje tím, že hodnota této limity je rovna jedné. V některé z dalších kapitol tuto skutečnost ukážeme. Připomeneme si přitom, jak je oblouková míra definovaná.

1.5.1 Nevlastní limity, jednostranné limity


Výše uvedené limity popisují chování funkce v okolí bodu $x_0 \in \mathbb{R}$, a to takové chování, kdy funkční hodnoty jsou blízké hodnotě $L \in \mathbb{R}$ pro x blízké x_0 . Číslo L nazýváme limitou funkce v bodě x_0 .

Pojem limita funkce zahrnuje i případy, kdy některé z čísel x_0 , L , nebo

¹⁰Jako například v (1.1), (1.3), (1.4).

případně obě, jsou nekonečné. Vysvětlíme na funkci f a jejím grafu.

$$f(x) = \frac{x+1}{2x+1}$$



Pro x velké kladné je funkční hodnota blízká jedné polovině. Říkáme, že má funkce f v bodě $+\infty$ limitu rovnou $1/2$ a o limitě mluvíme jako o vlastní limitě v nevlastním bodě.

Předpona ne ve slově nevlastní označuje nekonečnou hodnotu.

Podobně je limita funkce f v bodě $-\infty$ rovna $1/2$.

Úkol. Zodpovězte otázky: Jak se jmenuje křivka, která je grafem funkce f ? Jaký má tato křivka vztah k přímkce o rovnici $y = 1/2$? A jak vztah křivky a přímky souvisí s nevlastními limitami, o kterých se píše výše?

Nevíte-li si rady, tak načrtněte graf funkce f , popište osy, dokreslete na ně měřítko a načrtněte i přímku o rovnici $y = 1/2$.


V bodě $x = -1/2$ není funkce f definovaná a v jeho okolí nabývá velkých hodnot. Pro x o trochu větší než $-1/2$ jsou funkční hodnoty velké kladné – říkáme, že má funkce v bodě $x = -1/2$ zprava limitu rovnou $+\infty$ a mluvíme o nevlastní limitě ve vlastním bodě.

Podobně: v bodě $x = -1/2$ zleva má funkce limitu rovnou $-\infty$.

Úkol. Zodpovězte stejné otázky jako výše pro přímku o rovnici $x = -1/2$.

Ještě jeden graf a příklad: $x \mapsto 2^{1/x}$ ¹¹.

¹¹Tento zápis čteme: funkce přiřadí číslu x číslo $2^{1/x}$. Všimněte si, že jsme funkci nepojmenovali.



Limita v bodě $x = 0$ zleva je rovna nule, zprava je rovna $+\infty$.

Z grafu lze tušit i limity v bodech $\pm\infty$. V kapitole o limitách složené funkce si vysvětlíme, že jsou obě rovny jedné. Pokud se nad nimi chcete zamyslet už teď, tak si rozmyslete, jakých hodnot nabývá výraz $2^{1/x}$ pro x hodně velké kladné, případně hodně velké záporné.

Úkol. Jednostranné limity v nule jsme určili z grafu. Určete je bez grafu jen z vlastností (a grafů) funkcí $x \mapsto y = 1/x$, $y \mapsto 2^y$.

Dalším příkladem jednostranných limit je „zaokrouhlovací“ funkce z konce článku 1.5. Limita této funkce v bodě 0.5 zleva je rovna nule a zprava rovna jedné.

1.6 Aproximace funkcí


Někdy si potřebujeme práci s funkcemi zjednodušit, proto „složitou“ funkci nahradíme „jednodušší“ funkcí. Za toto nahrazení a zjednodušení zaplatíme menší přesností. Místo o nahrazení mluvíme většinou o *aproximaci*.

Za aproximující funkci často volíme lineární funkci, nebo, chceme-li aproximaci zpřesnit, polynom.

Aproximace může být lokální nebo globální.

1.6.1 Aproximace polynomem


Ukážeme na grafu a na tabulce funkčních hodnot dvě různé aproximace funkce sinus polynomem třetího stupně.



Vlevo je černě graf funkce sinus na intervalu $[0, \pi/2]$ a červeně na stejném intervalu graf polynomu. Nazýváme ho Taylorův polynom a budeme se jím v některé z dalších kapitol zabývat.

$$T : x \mapsto x - \frac{x^3}{6}$$

Na dalším obrázku je podobná situace, tentokrát s interpolačním¹² polynommem.



Grafy se téměř překrývají. Při zvětšení je vidět, jak černý graf přechází několikrát přes červený. Potvrdí se to v tabulce dole.^a

$$I : x \mapsto -0.114x^3 - 0.066x^2 + 1.023x - 0.0011$$

^aKoeficienty jsou zaokrouhlené. Rozdíly v tabulce jsou spočítané pro přesnější hodnoty koeficientů.

x	$\sin x$	$T(x)$	$I(x)$	$T(x) - \sin x$	$I(x) - \sin x$
0	0	0.000	-0.001	0	-10^{-3}
0.2	0.199	0.199	0.200	-3×10^{-6}	10^{-3}
0.4	0.389	0.389	0.390	-9×10^{-5}	6×10^{-4}
0.6	0.565	0.564	0.564	-6×10^{-4}	-8×10^{-4}
0.8	0.717	0.715	0.716	-3×10^{-3}	-10^{-3}
1	0.841	0.833	0.841	-8×10^{-3}	-6×10^{-4}
1.2	0.932	0.912	0.933	-2×10^{-2}	9×10^{-4}
1.4	0.985	0.943	0.987	-4×10^{-2}	10^{-3}

V tabulce je v prvním sloupci hodnota proměnné x , ve druhém její funkční hodnota $\sin x$, ve třetím je hodnota Taylorova polynomu $T(x)$, ve čtvrtém hodnoty interpolačního polynomu $I(x)$ a v pátém a šestém jsou hodnoty rozdílů $T(x) - \sin x$, $I(x) - \sin x$. Tyto rozdíly ukazují kvalitu aproximace. Vidíme, že aproximace Taylorovým polynommem je dobrá v okolí bodu nula a ve větší vzdálenosti od bodu nula se zhoršuje. Aproximace interpolačním polynommem je stejně dobrá v celém intervalu. Taylorův polynom proto někdy nazýváme *lokální aproximací* a interpolační polynom *globální aproximací*.

V textu se budeme podrobněji zabývat lokální aproximací. Nejdříve budeme aproximovat lineární funkcí a ukážeme něco, co je intuitivně jasné, a sice, že nejlepší lineární aproximaci získáme pomocí tečny ke grafu funkce. Později přejdeme k aproximaci polynommem vyššího stupně než jedna.


Otázky. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak kalkulačka počítá sinus? Pokud byste měli na výběr některý z interpolačních polynomů, přitom kvůli větší přesnosti bychom použili polynomy vyššího stupně, který byste použili? Šlo

¹²Vybrali jsme čtyři body z intervalu $[0, \pi/2]$ a sestavili polynom mající stejnou funkční hodnotu jako aproximovaná funkce sinus. Více si zvědavý čtenář může přechíst například v [2], v tomto textu se interpolačnímu polynomu věnovat nebudeme.

by oba polynomy zkombinovat? Jak byste je zkombinovali, aby byla přesnost a rychlost výpočtu¹³ co nejlepší?


1.7 Derivace

Dalším pojmem je *derivace*, která „malé“ změny proměnných přesněji kvantifikuje. Podívejme se, co se děje s podílem přírůstků funkce a její proměnné $\Delta f/\Delta x$ při zmenšování Δx k nule. Vysvětlíme na funkci, jejímž grafem je oblouček, vezmeme tu z článku 1.2. Na obrázcích je kromě grafu funkce f a bodu x_0 na ose x zobrazen měnící se přírůstek Δx . Dále je na každém obrázku uveden podíl $\Delta f/\Delta x$ zaokrouhlený na setiny.



Na následujícím obrázku je zobrazen výřez z posledního grafu s nejmenší hodnotou Δx .

¹³Čím více členů polynom má, tím déle se počítá jeho funkční hodnota.



Vidíme, že se graf funkce ve výřezu mezi x_0 a $x_0 + \Delta x$ podobá úsečce. To se projeví tím, že se podíl $\Delta f / \Delta x$ málo mění při dalším zmenšování Δx .¹⁴

V tabulce jsou uvedeny podíly přírůstků v závislosti na přírůstku proměnné, za čarou i pro dále se zmenšující hodnotu přírůstku Δx .¹⁵

Δx	1.5	1.0	0.5	0.2		0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
$\Delta f / \Delta x$	0.54	0.64	0.77	0.88		0.92	0.94	0.95	0.96	0.96

Vidíme, že se hodnoty podílu „ustalují“ na 0.96. Podíl $\Delta f / \Delta x$ má pro Δx blížíící se k nule limitu rovnou tomuto číslu. Tuto limitu nazýváme *derivací funkce v bodě x_0* .


Přímku procházející bodem $[x_0, f(x_0)]$, na které jsou přírůstky Δy , Δx přímo úměrné a derivace je konstanta této úměrnosti, budeme nazývat *tečnou ke grafu funkce v bodě x_0* .¹⁶ Označíme-li derivaci v bodě x_0 symbolem D , má tato tečna rovnici

$$y = D(x - x_0) + f(x_0) \quad (1.5)$$

¹⁴Je-li grafem opravdu úsečka, je přírůstek Δf přímo úměrný přírůstku Δx a uvedený podíl je tedy konstantní. Pro podrobnosti odkazujeme na kapitolu 6, dodatek o přímé úměře.

¹⁵Pro případ, že by chtěl čtenář uvedenou tabulku přepočítat, mu prozradíme předpis funkce $\sqrt{6x - x^2 - 4} + 0.06(x - 1)^2 - 0.5$ a bod $x_0 = 1.5$.

¹⁶Když mluvíme o chování funkce v bodě, například o tečně v bodě, máme na mysli bod na ose x charakterizovaný jedním reálným číslem. V grafu pak toto chování znázorňujeme zpravidla v bodě o dvou souřadnicích $[x, f(x)]$.



Na obrázku je graf funkce s tečnou a barevně vyznačenými přírůstky.

Červeně je vyznačen přírůstek funkce Δf .

Zeleně je vyznačen přírůstek na tečně, budeme ho značit df a nazývat *lineární částí přírůstku funkce*.

Z podrobnosti trojúhelníků plyne pro proměnné Δx (tedy nejen to na obrázku nakreslené)

$$df/\Delta x = D.$$


Modře je vyznačen rozdíl přírůstků $df - \Delta f$.

Výše jsme se zmiňovali, že tečna je grafem lokální aproximace funkce. Rozdíl $df - \Delta f$ je pak chybou takové aproximace. Ze vztahů $df/\Delta x = D$, $\Delta f/\Delta x \doteq D$ plyne

$$\frac{df - \Delta f}{\Delta x} \doteq 0. \quad (1.6)$$

V kapitole o derivaci tento vztah budeme interpretovat: chyba aproximace $df - \Delta f$ je pro malé hodnoty Δx ve srovnání s Δx zanedbatelná.


Uvedeme ještě několik příkladů. Na následujících obrázcích nás zajímá bod, v němž je graf „zlomený“. Podíl přírůstků $\Delta f/\Delta x$ vpravo od tohoto bodu se liší od podílu vlevo. Graf funkce nemá v tomto bodě tečnu a funkce nemá v tomto bodě derivaci. Na obrázku vpravo jsou ke grafu tečkovaně dokresleny „polotečny“ na obě strany.



Podobným příkladem je funkce absolutní hodnota: $x \mapsto |x|$ v bodě nula.

V dalších příkladech ukážeme, že tečna ke grafu funkce tak, jak jsme

ji definovali, nemusí mít obvyklý geometrický význam. Její hlavní význam vyjadřuje vztah (1.6). Na obou obrázcích dole nás zajímá tečna ke grafu funkce v počátku soustavy souřadné. Z geometrie jste zvyklí, že například kružnice leží celá na jedné straně své tečny. Na obrázku vlevo tomu tak není a tečna protíná graf v tečném bodě. Na obrázku vpravo je tečnou osa x , protože vyhovuje aproximační vlastnosti (1.6) a nevadí, že v okolí tečného bodu graf tečnu mnohokrát¹⁷ protne.



1.8 Nekonečně malé veličiny

Pojem derivace funkce pochází od sira Isaaca Newtona (1642 – 1727) a Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646 – 1716). Pojmy spojitosti funkce (Bolzano 1817) a limity funkce (Weierstrass 1874) jsou o víc jak sto let mladší. Pánové Newton a Leibniz za derivaci považovali podíl nekonečně malých přírůstků funkční hodnoty a proměnné funkce.

Nekonečně malý přírůstek proměnné x označíme dx . Jemu odpovídá nekonečně malý přírůstek funkční hodnoty $dy = f(x + dx) - f(x)$. Pro funkci $f(x) = x^2$ dostaneme

$$dy = (x + dx)^2 - x^2 = 2x dx + (dx)^2.$$

Odtud dostaneme podíl

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x dx + (dx)^2}{dx} = 2x + dx$$

Přírůstek dx je nekonečně malý, proto za něj dosadíme nulu a získáme derivaci funkce f

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

¹⁷Dokonce nekonečněkrát, předpis funkce je $x \mapsto x^2 \sin(1/x)$. Srovnajte s grafem funkce $x \mapsto x \sin(1/x)$ uvedeným v 1.3

Ve výpočtu je rozpor: výrazem dx nejdříve dělíme a pak za něj dosadíme nulu. S tímto rozparem se matematici dlouhé roky vyrovnávali konceptem nekonečně malé nenulové veličiny, kterou chápali intuitivně. Teprve v dobách Bolzana a Weierstrasse matematici začali používat pojmy spojitosti a limity k vyřešení tohoto rozporu.

1.8.1 Přednášky Zbyňka Kubáčka

Pokud se chcete o nekonečně malých veličinách dozvědět více a rozumíte slovenštině, najdete si na youtube přednášky Zbyňka Kubáčka. Níže vidíte snímek z jedné z nich právě v okamžiku, kdy vysvětluje výše uvedený příklad.

Před prvou přednáškou z matematickej analýzy
Zbyněk Kubáček

FSI P2

$F: y = x^2$

$(x + dx)^2$
 x^2

$dy = (x + dx)^2 - x^2$

$\frac{\Delta YUY' - \Delta SY}{|YX|} = \frac{|Y'U|}{|YU|} = \frac{dy}{dx}$

$Y[x; y]$ aj $Y'[x + dx; y + dy]$ ležia na grafe funkcie $y = x^2$:

$y = x^2, \quad y + dy = (x + dx)^2$

$y + dy = x^2 + 2xdx + (dx)^2, \quad dy = 2xdx + (dx)^2, \quad \frac{dy}{dx} = 2x + dx = 2x$


**VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ STROJNÍHO
V BRNĚ INŽENÝRSTVÍ**

**Science & Technology
Club**

SKAS FSI

1.9 Software na kreslení grafů

Během výuky budeme používat portály [desmos.com](https://www.desmos.com), [geogebra.org](https://www.geogebra.org), [wolfram-alpha.com](https://www.wolfram-alpha.com) k vykreslení grafů funkcí. Takto vykreslené grafy berte jako užitečnou ilustraci, ale mějte na paměti, že ne vždy vede jejich přímočará interpretace ke správným závěrům. Jako příklad uvedeme graf funkce $f(x) = 2^{-1/x^2}$ na dvou různých intervalech. Jak byste z grafu určili množinu kořenů funkce? A jak vám tato množina vyjde výpočtem?



Zajímavé body grafu budeme hledat vždy výpočtem. Uvedené portály pak použijeme na kontrolu výpočtů, případně je použijte jako vodítka, které vaše výpočty nasměruje, nevíte-li si s nimi rady.

1.10 Elementární funkce

Dalším naším cílem bude definování elementárních funkcí a zkoumání jejich vlastností.

Začneme funkcemi, k jejichž definici stačí aritmetické operace. Patří mezi ně *polynomy*, možná je znáte pod názvem mnohočleny, a podíly polynomů, ty budeme nazývat *racionální funkce*.

Řekneme si něco o kořenech polynomů a o rozkladu polynomu na součin kořenových činitelů. Tyto pojmy by vám měly být povědomé pro kvadratické polynomy. My je budeme uvažovat i pro polynomy vyššího stupně.

Předpokládáme, že čtenář umí sčítat racionální funkce, my si ukážeme opačnou operaci, a sice rozklad racionální funkce na součet jednodušších racionálních funkcí, těm budeme říkat *parciální zlomky*. Řekneme si, jak ze jmenovatele racionální funkce určit jmenovatele parciálních zlomků, například

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

a ukážeme si, jak se spočítají hodnoty čísel A , B případně C .

Další funkce, kterými se budeme zabývat, jsou odmocniny. Ukážeme si, že existence odmocnin není úplně samozřejmá a že souvisí s vlastností reálných čísel, o které budeme mluvit v kapitole o číslech.

V kapitole o spojitých funkcích pak ukážeme, že funkce definovaná na intervalu, která je na něm spojitá a navíc buď rostoucí nebo klesající má inverzní funkci, jejíž definiční obor je opět interval. Tato vlastnost nám pak bude sloužit při definování dalších inverzních funkcí, a sice logaritmů a cyklometrických funkcí.¹⁸

Probereme vlastnosti mocninných funkcí. Budeme je budovat postupně pro exponent, který je přirozené číslo, nula, celé číslo, racionální číslo. Vysvětlíme si přitom, že vztahy

$$x^0 = 1 \quad x^{-1} = 1/x \quad x^{1/2} = \sqrt{x} \quad (1.7)$$

jsou důsledkem přirozeného požadavku, aby vztah

$$a^{m+n} = a^m a^n, \quad (1.8)$$

který odvodíme pro exponenty $m, n \in \mathbb{N}$ platil i pro $m, n \in \mathbb{R}$.

Od mocninných funkcí přejdeme k funkcím exponenciálním. Vztahy (1.7) nám umožní pro $a > 0$ definovat funkci $q \mapsto a^q$ pro $q \in \mathbb{Q}$. Z množiny racionálních čísel pak exponenciální funkci spojitě rozšíříme na množinu reálných čísel.


V [2] je symbolem \exp označena exponenciální funkce se základem $e \doteq 2.718$. Je zde definovaná vztahy

$$(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R})(\exp(x_1 + x_2) = \exp(x_1) \exp(x_2)) \quad (1.9)$$

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exp(x) \geq 1 + x) \quad (1.10)$$

Přitom (1.9) je jen jinak napsaný vztah (1.8). Vztah (1.10) určuje mimo jiné základ exponenciální funkce, viz následující obrázky.

¹⁸Mezi cyklometrické funkce patří arkussinus, arkuskosinus, arkustangens a arkuskotangens. Na kalkulače jsou obvykle značeny jako \sin^{-1} , \tan^{-1} a je dobré si pamatovat, že „na mínus prvou“ neoznačuje mocninu.



Na obou obrázcích je plnou čarou graf funkce \exp s přímkou o rovnici $y = x + 1$. Nerovnost (1.10) se na grafu projeví tím, že se graf exponenciální funkce přímkou dotýká a mimo bod dotyku leží nad přímkou.

Tečkovane jsou na obrázcích grafy s jiným základem. Na obrázku vlevo $x \mapsto 2^x$, na obrázku vpravo $x \mapsto 4^x$.

Je vidět, že osu y oba tečované grafy protínají pod jiným úhlem než přímka a leží tedy částečně pod ní. Exponenciální funkce se základem 2 případně 4 tedy nesplňují (1.10).

Ukážeme si později, že vztah (1.10) navíc zajišťuje spojitost exponenciální funkce a tím i jednoznačné rozšíření z racionálních na reálné exponenty.

Budeme definovat logaritmus jako funkci inverzní k exponenciální funkci a budeme používat značení běžné v matematické literatuře – symbolem \log budeme značit logaritmus se základem e , který znáte pod názvem přirozený logaritmus. S dekadickým logaritmem se v matematické literatuře setkáváme zřídka.

Exponenciální funkci při obecném kladném základu pak definujeme pomocí exponenciální a logaritmické funkce vztahem $a^x = \exp(x \log a)$.

Připomeneme trigonometrickou definici goniometrických funkcí, zobecnění pro jiné než ostré úhly na jednotkové kružnici a odvodíme součtové vzorce pro sinus a kosinus. Řekneme si, že se goniometrické funkce dají definovat pomocí součtových vzorců podobně jako funkce exponenciální v (1.9), (1.10), ale více se tomuto způsobu věnovat nebudeme a odkážeme případného zájemce na [2]. Vystačíme s definicí na jednotkové kružnici a odvozenými součtovými vzorci.

Kapitola 2

Příklady na čtení z grafu

V úvodní kapitole jsme probrali, co je funkce a co je graf funkce. V této kapitole procvičíme čtení informací z grafů funkcí na grafech popisujících reálné jevy.

(Nahoře je moje formulace, níže návrh přestylizace od chatGPT.)

V úvodní kapitole jsme diskutovali o definici funkce a o tom, co představuje graf funkce. V této kapitole se budeme věnovat praktickému cvičení v čtení informací z grafů funkcí, které popisují skutečné situace nebo jevy.


2.1 Geometrické úlohy

Matematická analýza se rozvíjela od sedmnáctého století jako nástroj především pro fyziku a také pro geometrii. Cílem této kapitoly je procvičit matematizaci reálných jevů a zopakovat vlastnosti funkcí. Použijeme k tomu nádoby různých tvarů, u kterých prozkoumáme závislosti plošného obsahu hladiny a objemu tekutiny na výšce hladiny.


2.1.1 Úlohy k řešení

Následují náčrtky a popisy nádob.


1. Pet lahev: je rotačně symetrická, hladiny jsou kruhy.



2. Kuželovitá baňka: je rotačně symetrická, hladiny jsou kruhy.









3. Necky: hladiny jsou obdélníky. Vlevo je pohled zepředu, vpravo shora.



Úkoly.

1. Mezi následujícími grafy nalezněte ke každé nádobě grafy závislosti plošného obsahu hladiny na výšce hladiny a závislosti objemu tekutiny na výšce hladiny. Kterých vlastností funkcí využíváte?
2. Jak z grafů získáte odpověď na otázku: jaká bude výška hladiny po nalití daného objemu tekutiny?






2.1.2 Řešený příklad

Na příkladu hrnku s uchem ukážeme odvození závislosti objemu tekutiny na výšce hladiny.

Na obrázku je znázorněn tvar hrnku, když si odmyslíme ucho, je jeho tvar rotačně symetrický a hladiny mají tvar kruhu.



Začneme případem, kdy je hladina tekutiny v dolní rozšiřující se části hrnku. Hrněk zde má tvar komolého kužele. Jedna z podstav tohoto kužele je podstavou hrnku a má tedy poloměr $r_1 = c/2 = 15j$ (viz popis na následujícím obrázku). Výšku komolého kužele označíme h . Druhá podstava je totožná s hladinou a její poloměr vyjádříme ve tvaru $r_2 = c/2 + x$, kde x jsme vyznačili na obrázku a vyjádříme ho pomocí výšky h . Použijeme k tomu podobnost trojúhelníků, jeden má odvěsny a , b , druhý odvěsny h , x . Odtud plyne vztah $b/a = x/h$ a odtud vyjádříme $x = bh/a$. Poloměr hladiny tedy je $r_2 = c/2 + bh/a$, po dosazení a drobné úpravě je $r_2 = 15j + h/2$.

Dosazením do vzorce pro objem komolého kužele

$$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$


dostaneme

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi h(15^2 + 15(15 + h/2) + (15 + h/2)^2)$$

a případně po úpravě

$$V(h) = \pi(225h + \frac{15}{2}h^2 + \frac{1}{12}h^3)$$


Níže pak vidíme graf závislosti objemu tekutiny na výšce její hladiny pro $h \in [0, a]$.



Až k místu, kde začíná ucho hrnku spočítáme objem tekutiny jako součet $V(a)$, tedy objemu celé dolní rozšiřující se části nádoby, a objemu válce o poloměru podstavy $r = b + c/2$ a výšce $h - a$. Závislost objemu tekutiny na výšce hladiny je v tomto úseku lineární, grafem je tedy úsečka.



Dosazením hodnot za a , b , c a po úpravě dostaneme předpis funkce popisující závislost objemu tekutiny V na výšce hladiny h .

$$V(h) = \begin{cases} \pi(225h + \frac{15}{2}h^2 + \frac{1}{12}h^3) & h \in [0, 10] \\ \pi(900h - 5916.\bar{3}) & h \in (10, 35] \end{cases}$$



Abychom zvýšili hladinu nad $h = a + d$, musíme naplnit ucho hrnku. Objem tekutiny, která naplní ucho před dalším zvýšením hladiny označíme ΔV . Tento objem nebudeme vyčíslovat, pouze ho odhadneme¹ a zaměříme se na to, jak se projeví na grafu závislosti V na h : nespojitostí a skokem ve směru osy V o ΔV .

¹Ve skutečnosti jeho hodnotu nadsadíme, aby byla na grafu viditelná.



Úkol – čtení z grafu.

1. Do nádoby jsme nalili tekutinu. Změříme výšku hladiny. Jak použijeme graf k určení objemu nalité tekutiny?
2. Do nádoby se chystáme nalít změřený objem tekutiny. Jak z grafu určíme výšku hladiny?

2.2 Sbírka úloh *Matematika a svět okolo nás*

Následující obrázky jsou ze sbírky úloh *Matematika a svět okolo nás*.²

²Sbírka je dílem kolektivu autorů pod vedením Zbyňka Kubáčka a je k dispozici online. Jednotlivé úlohy naleznete na <http://hore.dnom.fmph.uniba.sk/~esfprojekt/heslo.htm>.


Úkol – čtení z grafu. Vyřešte úlohy na obrázcích.

GLYKÉMIA

Pocit hladu je ovplyvňovaný hladinou glukózy v krvi. Glukóza vzniká v žalúdku z cukrov, ktoré prijímame v potrave. Po jedle jej množstvo v krvi rastie. Najvyššiu hodnotu dosiahne asi pol hodiny po konzumácii, potom postupne klesá. Keď klesne pod istú hodnotu, dostane mozog signál, ktorý vnímame ako hlad.

Množstvo (hladina) glukózy v krvi sa nazýva *glykémia*. Udáva sa v jednotkách mmol/l (milimól na liter) krvi, určujúcich počet molekúl glukózy v jednom litri krvi.

Nasledujúci graf zobrazuje množstvo glukózy v krvi pacienta počas časti dňa (od 4:00 do 17:00).



čas (hod)	glykémia (mmol/l)
4	4.5
5	4.5
6	4.5
7	4.5
8	8.5
9	5.0
10	4.8
11	4.5
12	4.0
13	8.5
14	5.0
15	4.8
16	4.5
17	4.5

Úloha 1: Akú najväčšiu hodnotu dosiahla glykémia v zobrazenom grafe?

Odpoveď: mmol/l

Úloha 2: Kedy pacient raňajkoval a kedy obedoval? Svoju odpoveď zdôvodnite.

Odpoveď: Pacient raňajkoval približne o, obedoval približne o


Úloha 3: Pacient večeral o 19:00. Na základe tejto informácie dokreslite daný graf pred úlohou na úseku od 17:00 do 23:00.



Ak je hodnota glykémie nalačno alebo dve hodiny po jedle vyššia, ide o poruchu regulácie glykémie nalačno, poruchu tolerancie glukózy alebo cukrovku. V tabuľke sú kritéria svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre tieto poruchy:

glykémia (mmol/l)	porucha regulácie glykémie nalačno		porucha tolerancie glukózy		cukrovka	
	nalačno	po 2 hod.	nalačno	po 2 hod.	nalačno	po 2 hod.
	$\geq 6,1$ a súčasne $< 7,0$	$< 7,8$	$< 7,0$	$\geq 7,8$	$\geq 7,0$	$\geq 11,1$

Úloha 4: Pán Novák raňajkoval o 8:00. Lekár zistil podľa grafu, že jeho hodnoty glykémie medzi 7:00 a 10:00 spĺňajú všetky uvedené kritéria pre poruchu tolerancie glukózy. Ktoré z nasledujúcich grafov a) až e) by mohli byť grafmi glykémie pána Nováka v čase od 7:00 do 10:00? Zakružkujte písmená správnych odpovedí.



Kapitola 3

Čísła

3.1 Racionální čísła

Zamyšlení. Co je to racionální číslo?

Pokud odpovíte, že zlomek, je třeba říct, co tím myslíte. Je $\pi/2$ zlomek? Pokud ano, je $\pi/2$ racionální číslo? Pokud ne, tak co je to zlomek?

V [1] je popisována tzv. první krize matematiky ve starověkém Řecku. Řeční učenci věřili, že je každá dvojice úseček *souměřitelná*, což znamená, že jsou jejich délky celistvým násobkem určité společné jednotkové délky. Označíme-li tuto základní délku d a má-li první úsečka délku m -násobnou, tedy md a druhá úsečka délku n -násobnou, tedy nd , pak je poměr délek obou úseček roven m/n .

Pokud by tedy byla každá dvojice úseček souměřitelná, pak zvolíme některou úsečku jako jednotkovou a každá další má délku rovnu poměru dvou celých čísel. Takový podíl nazýváme *racionálním číslem*. Racionální od slova *ratio*, neboli podíl. Význam slova racionální, česky rozumný, je pravděpodobně odvozen právě od slova ratio a víry v rozumnost délek vyjádřených poměrem.¹

Krize matematiky přišla s objevem, že úhlopříčka čtverce o jednotkové straně má délku odmocnina ze dvou a ta není racionálním číslem.

Věta o odmocnině. Odmocnina ze dvou není racionální číslo.

¹Příznávám, že si tento příběh víceméně domýšlím. Možná jsem někdy dřív něco takového někde četla, ale nedokážu si vzpomenout kde. Poznámkou o ratiu a racionalitě se snažím motivovat studenty zapamatovat si definici racionálního čísla. Občas se zděšením zjistím, že s tím mají problém. A tak se kvůli tomu dopouštím bájení.

DŮKAZ provedeme sporem. Budeme předpokládat, že naše tvrzení neplatí, tedy že existují přirozená čísla m , n splňující $(m/n)^2 = 2$ a odvodíme spor, tedy něco, co nemůže být pravda. Odtud usoudíme, že náš výchozí předpoklad nemůže platit, a tedy platí tvrzení věty.

O číslech m , n budeme navíc předpokládat, že nejsou obě sudá. Pokud by byla obě sudá, tak bychom ve zlomku m/n pokrátili dvěma nebo vhodnou mocninou dvou a dostali zlomek, který nemá i čitatele i jmenovatele sudého.

Ze vztahu $(m/n)^2 = 2$ po úpravě odvodíme $m^2 = 2n^2$. Protože je pravá strana sudá, musí být sudá i levá strana. Odtud plyne, že je m sudé. Kdyby nebylo sudé, tedy bylo liché, tedy bychom ho mohli zapsat ve tvaru $m = 2k - 1$ s přirozeným k , pak by bylo $m^2 = 4(k^2 - k) + 1$, a tedy by m^2 bylo liché.

Víme tedy, že je m sudé. Proto ho můžeme zapsat pomocí přirozeného l ve tvaru $m = 2l$. Odtud je $m^2 = 4l^2$. Dosazením do $m^2 = 2n^2$ dostaneme $4l^2 = 2n^2$, pokrátíme na $2l^2 = n^2$ a stejnou úvahou jako výše odvodíme, že je n sudé. A to je slibovaný spor a důkaz zde končí. \square

3.2 Vlastnosti reálných čísel

Máme na mysli vlastnosti (1) až (13) vypsané v [2] na stranách 20, 21 a 25. Poznamenejme, že jsou zde vlastnosti nazývány axiomy. Budeme tato slova² zaměňovat, protože nepředpokládáme, že čtenář zná rozdíl mezi nimi. Dokonce zatím rezignujeme na snahu tento rozdíl vysvětlit. Omezíme se na diskuzi ve třídě, ze které snad nějaké vysvětlení vzejde. Konstatujme jen, že pochopit, čím se liší, je těžké, nicméně čtenář mající ambici pochopit, čím se liší matematika od pouhého počítání, by měl o rozdíl přemýšlet.

Vlastnosti (1) až (9) jsou čtenáři dobře známé. Ukážeme na příkladu, jak je používáme při řešení rovnic.

Příklad. Ze vztahu mezi proměnnými $xy + 2x + y = 5$ chceme vyjádřit proměnnou y v závislosti na proměnné x .

Vztah (2), asociativitu sčítání, jsme použili k vypuštění závorek, které nyní doplníme: $xy + (2x + y) = 5$.

Použijeme (1), komutativitu sčítání: $xy + (y + 2x) = 5$.

Použijeme (2), asociativitu sčítání: $(xy + y) + 2x = 5$.

Použijeme (7), existenci jednotkového prvku: $(xy + y \cdot 1) + 2x = 5$.

Použijeme (5), komutativitu násobení: $(xy + 1 \cdot y) + 2x = 5$.

²Slova vlastnosti a axiomy.

Použijeme (9), distributivní zákon: $(x + 1)y + 2x = 5$.

Použijeme (4), existenci opačného prvku k $2x$: $(x + 1)y + 2x + (-2x) = 5 + (-2x)$. Na levé straně jsme nenapsali závorky – použili jsme asociativitu sčítání.

Použijeme (4), vlastnost opačného prvku: $(x + 1)y + 0 = 5 + (-2x)$.

Použijeme (3), vlastnost nulového prvku: $(x + 1)y = 5 + (-2x)$.

Použijeme (5), komutativitu násobení: $y(x + 1) = 5 + (-2x)$.

Nyní bychom rádi použili (8), vlastnost inverzního prvku k $x + 1$. To můžeme udělat v případě $x + 1 \neq 0$, tedy pro $x \neq -1$.

Dostaneme $y(x + 1)(x + 1)^{-1} = (5 - 2x)(x + 1)^{-1}$.

Použijeme (8), vlastnost inverzního prvku: $y \cdot 1 = (5 + (-2x))(x + 1)^{-1}$.

Použijeme (7), vlastnost jednotkového prvku: $y = (5 + (-2x))(x + 1)^{-1}$.

Pro $x = -1$ vyřešíme rovnici $y(x + 1) = 5 + (-2x)$ dosazením: $0 = 7$.

Závěr:

Pro $x = -1$ nemá rovnice žádný kořen³.

Pro $x \neq -1$ má jeden kořen $y = (5 + (-2x))(x + 1)^{-1}$.

Poznámka o odčítání a dělení. Všimněte si, že vlastnosti se týkají pouze operací sčítání a násobení. Operace odečítání a dělení jsou skryté v axiomech opačného a inverzního prvku. Odečítání $a - b$ je zkrácený zápis pro součet $a + (-b)$. Dělení a/b je zkrácený zápis pro součin ab^{-1} .

V příkladu bychom pak místo $y = (5 + (-2x))(x + 1)^{-1}$ napsali $y = (5 - 2x)/(x + 1)$. V dalším textu budeme tento zápis používat.

Poznámka o umocňování. Další operací odvozenou od násobení jsou mocniny s přirozeným exponentem. Viz následující definice.

Definice. Nechť je $a \in \mathbb{R}$. Pod symbolem a^1 budeme rozumět číslo o hodnotě a , tedy $a^1 = a$. Pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ budeme pod symbolem a^n rozumět číslo o hodnotě $a^{n-1}a$, tedy $a^n = a^{n-1}a$.

Úkoly.

1. Rozmyslete si, jak z výše uvedené definice plynou vám známé vztahy $a^2 = aa$, $a^3 = aaa$, $a^4 = aaaa$, ...
2. Odvoďte z axiomů vzorce $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Na příkladu nerovnice ukážeme použití vlastností (12).

³Někdy říkáme, že rovnice nemá řešení.

Příklad. Chceme vyřešit nerovnici $3x + 4 < 0$.

Použijeme první vztah vlastnosti (12), úpravu nerovnosti přičtením čísla -4 k oběma stranám. Dostaneme: $3x < -4$.

Použijeme druhý vztah vlastnosti (12), vynásobení nerovnosti kladným číslem 3^{-1} . Dostaneme: $x < -4/3$.

Poznámka o algebraických strukturách. V algebře budete probírat algebraické struktury – množiny s operacemi. Důležitou roli bude hrát struktura zvaná *těleso*⁴, jehož typickými příklady jsou racionální, reálná a komplexní čísla s operacemi sčítání a násobení. Těleso budete definovat jako množinu se dvěma operacemi, které splňují vlastnosti (1) až (9).

Poznamenejme ještě, že na množině komplexních čísel není definováno uspořádání, proto pro ně nemá smysl uvažovat vlastnosti (10) až (12). Množina racionálních čísel tyto vlastnosti má.

Reálná a racionální čísla se liší až vlastností (13), se kterou se nejspíš čtenář teprve seznamuje a která je náročná na pochopení. Nazýváme ji vlastností supréma a budeme se jí zabývat v článku 3.4.

V následujícím článku se budeme zabývat dalšími vlastnostmi reálných čísel a ukážeme, že plynou z axiomů (1) až (12).

Poznámka o číslech a názvech. Čtenář by měl být schopný se zmiňovanými vlastnostmi pracovat. Užitečné je pamatovat si jejich názvy a zbytečně pamatovat si jejich čísla. Zde jsme čísla použili jen kvůli snazší dohledatelnosti v [2]. V dalším textu budeme místo čísel používat názvy.

Poznámka o podrobnosti odvozování a důkazů. Předchozí příklady jsme udělali velmi podrobně. Chtěli jsme ukázat, jak obvyklé úpravy rovnic a nerovnic souvisí s axiomy reálných čísel. V dalším budeme stručnější, především proto, abychom výklad příliš „nezahltili“ podrobnostmi. Vždy by však bylo dobré, kdyby čtenář uměl v případě potřeby takové vysvětlení až na axiomy provést. Zvláště takový rozbor doporučujeme v případě pochybností o platnosti použitého nebo odvozeného.

Při kompromisu mezi stručností a přehledností na jedné straně a pečlivostí a úplností na straně druhé se vždy řídíme cílovou čtenářskou skupinou. Proto je potřeba, aby studenti dávali autorce zpětnou vazbu a nebáli se říct, které partie textu jsou pro ně málo srozumitelné.

⁴V [2] je těleso nazýváno polem.

3.3 Další vlastnosti reálných čísel

V [2] je ve tvrzení 1.3.1 uvedeno i s důkazem pravidlo sčítání nerovností. My zde uvedeme pravidlo násobení nerovností.

Lemma o násobení nerovností. Nechť pro kladná čísla a, b, c, d platí $a < b$, $c < d$. Pak platí $ac < bd$.

DŮKAZ. Vynásobíme nerovnost $a < b$ číslem c : $ac < bc$. Nerovnost $c < d$ vynásobíme číslem b : $bc < bd$.

Na nerovnosti $ac < bc$, $bc < bd$ použijeme tranzitivitu (vlastnost 11). Dostaneme $ac < bd$. \square

Z pravidla o násobení nerovností plyne pravidlo o umocňování nerovností, jak ukazuje následující lemma.

Lemma o umocňování nerovností. Nechť pro kladná čísla a, b platí $a < b$ a nechť je $n \geq 2$ přirozené číslo. Pak platí $a^n < b^n$.

DŮKAZ. Použijeme předchozí lemma a vynásobíme nerovnost $a < b$ samu se sebou. Dostaneme $a^2 < b^2$, tedy závěr⁵ lemmatu pro $n = 2$.

Vynásobením nerovnosti $a < b$ s nerovností $a^2 < b^2$ dostaneme nerovnost $a^3 < b^3$, tedy závěr lemmatu pro $n = 3$.

Dalším krokem by bylo vynásobení nerovnosti $a < b$ s $a^3 < b^3 \dots$ a takto bychom mohli postupovat libovolně dlouho.

Můžeme to zkrátit tím, že vynásobíme nerovnost $a < b$ nerovností $a^n < b^n$. Dostaneme nerovnost $a^{n+1} < b^{n+1}$. Ukázali jsme tím, že z platnosti závěru lemmatu pro n plyne jeho platnost pro $n + 1$. Tomu říkáme *indukční krok* a tento způsob důkazu nazýváme *důkazem matematickou indukcí*.⁶ \square

Poznámka o předpokladu a závěru. Předchozí lemma bylo zformulováno jako implikace: jestliže platí $a < b$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, pak platí $a^n < b^n$.

Výrok $a < b$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ nazýváme *předpokladem* lemmatu, výrok $a^n < b^n$ *závěrem* lemmatu.

Čárky ve výroku $a < b$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ chápeme jako konjunkce \wedge („a zároveň“).

Poznámka o matematické indukci. Důkaz *matematickou indukcí* používáme na tvrzení o přirozených číslech. Skládá se ze dvou částí. V jedné části ukážeme platnost tvrzení pro nejmenší číslo, ve druhé takzvaný *indukční krok*.

⁵O předpokladu a závěru se čtenář dočte více v následující poznámce.

⁶O důkazu matematickou indukcí více v následující poznámce.

V indukčním kroku předpokládáme platnost tvrzení pro n a dokazujeme jeho platnost pro $n + 1$.

Nejmenší číslo je zpravidla $n = 1$, ale pokud chceme nějaké tvrzení dokázat třeba pro $n \geq 5$, pak je nejmenším číslem $n = 5$.

V [2] si může zvědavý čtenář přečíst o matematické indukci na stranách 27 až 32.

Čtenář jistě ví, že při násobení nerovnosti záporným číslem se obrací smysl nerovnosti. Zformulujeme a dokážeme tuto vlastnost.

Lemma o násobení nerovnosti záporným číslem. Nechť je $a < b$, $c < 0$. Pak je $ac > bc$.

DŮKAZ. K nerovnosti $c < 0$ přičteme opačný prvek $-c$. Dostaneme $0 < -c$. Nerovnost $a < b$ vynásobíme kladným číslem $-c$. Dostaneme $a(-c) < b(-c)$.

Níže ukážeme pomocné tvrzení: $a(-c) = -(ac)$. Pak platí i $b(-c) = -(bc)$. Přepíšeme tedy $a(-c) < b(-c)$ na $-(ac) < -(bc)$. K nerovnosti postupně přičteme ac , bc . Dostaneme $bc < ac$.

Dokažme ještě pomocné tvrzení. K důkazu $a(-c) = -(ac)$ stačí ukázat⁷, že $a(-c) + ac = 0$. Tady stačí použít na úpravu levé strany rovnosti distributivitu. Dostaneme $a(-c + c) = 0$, což plyne z vlastnosti opačného prvku a z dalšího pomocného tvrzení – cokoliv vynásobíme nulou, dostaneme nulu. \square

Poznámka o pomocných tvrzeních a stavbě důkazů. Předchozí důkaz by byl přehlednější, kdybychom lemmatu o násobení nerovnosti záporným číslem předřadili další dvě lemmata a pak se na ně v důkazu odkázali. Tato lemmata by tvrdila:

1. Pro každé $a \in \mathbb{R}$ platí $a \cdot 0 = 0$.
2. Pro každou dvojici $a, b \in \mathbb{R}$ platí $(-a)b = -(ab)$.

V [2] si na straně 22 přečtete definici neostré nerovnosti. Dokážeme pro ni pravidlo o násobení nerovností.

Lemma o násobení neostrých nerovností. Nechť pro nezáporná reálná čísla a, b, c, d platí $a \leq b$, $c \leq d$. Pak platí $ac \leq bd$.

DŮKAZ rozdělíme na několik případů. Rozmyslete si, že pokrývají všechny možnosti v předpokladech lemmatu.⁸

⁷Viz vlastnost opačného prvku.

⁸Viz poznámka o předpokladu a závěru.

1. a, b, c, d jsou kladná, $a < b$, $c < d$
z lemmatu o násobení nerovností plyne $ac < bd$, a tedy i $ac \leq bd$
2. a, b, c, d jsou kladná, $a = b$, $c < d$
z lemmatu o násobení nerovnosti $c < d$ kladným číslem a plyne $ac < bd$,
a tedy i $ac \leq bd$
3. a, b, c, d jsou kladná, $a = b$, $c = d$
pak je $ac = bd$, a tedy i $ac \leq bd$
4. b nebo d je rovno nule
z $b = 0$ plyne $a = 0$, a tedy $ac = 0 = bd$, a tedy i $ac \leq bd$; podobně pro
 $d = 0$
5. b a d jsou kladná a a nebo c je rovno nule
vynásobíme nerovnost $b > 0$ kladným d a dostaneme $bd > 0$; protože
je $ac = 0$, je $bd > ac$, a tedy i $bd \geq ac$

□

V lemmatu o umocňování nerovností jsme dokázali implikaci: jestliže platí $a < b$, pak platí $a^n < b^n$. Ve skutečnosti za uvedených předpokladů (a, b jsou nezáporná čísla) platí ekvivalence. Tu nyní dokážeme.

Lemma o umocňování coby ekvivalentní úpravě. Pro přirozené číslo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ a nezáporná reálná čísla a, b je $a < b$ ekvivalentní s $a^n < b^n$.

Poznámka o specifickém matematickém jazyku. Lemma jsme zformulovali pokud možno jazykem, kterým se běžně vyjadřujeme. Domníváme se, že v tomto případě to nebylo na újmu přesnosti vyjádření. V matematických textech se spíše používá následující jazyk: „nechť $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a, b \geq 0$. Pak jsou následující výroky ekvivalentní $a < b$, $a^n < b^n$ “. Při tvrzeních složitějších než je toto lemma je kvůli přesnosti takový jazyk nezbytností.

DŮKAZ LEMMATU O UMOCŇOVÁNÍ COBY EKVIVALENTNÍ ÚPRAVĚ. Ekvivalenci dokazujeme jako dvě implikace. Implikaci $a < b \Rightarrow a^n < b^n$ jsme dokázali výše v lemmatu o umocňování nerovností.

Dokážeme implikaci $a^n < b^n \Rightarrow a < b$ obměnou,⁹ tedy dokážeme implikaci $a \geq b \Rightarrow a^n \geq b^n$. Pokud je $a = b$, pak je $a^n = b^n$, a tedy je $a^n \geq b^n$. Pokud je $a > b$, pak je $a^n > b^n$, a tedy je $a^n \geq b^n$. □

⁹Implikaci „jestliže neplatí B , pak neplatí A “ nazýváme *obměněnou implikací* k „jestliže platí A , pak platí B “. Například: „jestliže máte z předmětu zkoušku, pak máte z předmětu

Poznámka o implikaci, jejím předpokladu a závěru.

V implikaci $a > b \Rightarrow a^n > b^n$ nazýváme výrok $a > b$ předpokladem, výrok $a^n > b^n$ závěrem.

Všimněte si, že oslabením závěru nepřestává implikace platit – z platnosti $a > b \Rightarrow a^n > b^n$ přímo plyne platnost $a > b \Rightarrow a^n \geq b^n$.

Na druhé straně oslabením předpokladu v platné implikaci můžeme dostat neplatné tvrzení. Implikace $a > b \Rightarrow a^n > b^n$ platí, ale implikace $a \geq b \Rightarrow a^n > b^n$ neplatí.¹⁰

Úkol. Všimněte si, jaké další vlastnosti reálných čísel používáte a odvoďte je z axiomů.

3.4 Supremum, infimum

Seznamte se z definicí horního odhadu, maxima, dolního odhadu a minima množiny v [2], definice 1.3.4, poznámka 1.3.5.

TODO PŘÍKLADY (Zkratka TODO znamená, že text není kompletní a bude později doplněn.)

Definice 1.3.6 – zdola omezená množina, shora omezená množina, omezená množina.

Definice 1.3.8 – supremum, infimum množiny.

TODO PŘÍKLADY (Zkratka TODO znamená, že text není kompletní a bude později doplněn.)

Lemma o supremu a infimu „oddělených“ množin. Pokud pro dvě množiny $A, B \subseteq \mathbb{R}$ platí

$$(\forall a \in A)(\forall b \in B)(a \leq b)$$

pak platí $\sup A \leq \inf B$.

Doporučení: před čtením důkazu nakreslete číselnou osu a několik prvků množiny A i B splňujících uvedenou vlastnost.


Důkaz. Uvažujme libovolné $b \in B$. Z předpokladů lemmatu plyne, že b je horní závorou množiny A . Supremum množiny A je nejmenší horní závora,

i zápočet“ a „jestliže nemáte z předmětu zápočet, pak z něj nemáte ani zkoušku“. Srovnejte s *obrácenou implikací* „jestliže máte z předmětu zápočet, máte z něj i zkoušku“. Více viz kapitola o jazyku matematiky.

¹⁰Pokud se rádi s přáteli přete o rozličných tématech, dávejte pozor, zda tyto zásady o oslabení/zesílení předpokladu a závěru v diskuzi vy nebo vaši přátelé dodržujete.

a proto platí $b \geq \sup A$ a platí to pro všechna $b \in B$. Odtud plyne, že $\sup A$ je dolní závora množiny B a odtud plyne $\sup A \leq \inf B$, protože infimum je největší dolní závora. \square

Ukážeme si dva případy použití lemmatu.



Uvedený obrázek je z kapitoly věnované limitám funkcí, kde ukážeme existenci jednostranných limit monotonních funkcí. Na obrázku je graf rostoucí funkce. Nás budou zajímat množiny M_1 , M_2 pro malé kladné δ

$$M_1 = \{f(x) : x \in (x_0 - \delta, x_0)\}$$

$$M_2 = \{f(x) : x \in (x_0, x_0 + \delta)\}$$

Je-li funkce f na intervalu $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ rostoucí, pak platí

$$(y_1 \in M_1, y_2 \in M_2) \Rightarrow y_1 < y_2$$

a z lemmatu o supremu a infimu oddělených množin plyne

$$\sup M_1 \leq \inf M_2 \tag{3.1}$$


Na obrázku jsou hodnoty $\sup M_1$, $\inf M_2$ vyznačeny na ose y a nerovnost je znázorněna jejich vzájemnou polohou.

V tomto příkladě můžeme místo lemmatu o supremu a infimu oddělených množin použít hodnotu $f(x_0)$, která je horní závorou množiny M_1 a dolní závorou množiny M_2 . Odtud plyne $\sup M_1 \leq f(x_0)$ a $\inf M_2 \geq f(x_0)$ a tedy i nerovnost (3.1).

Otázka. Z čeho plyne výše uvedené tvrzení, že je $f(x_0)$ horní závorou množiny M_1 a dolní závorou množiny M_2 ?

Další dva obrázky se týkají *Riemannova integrálu*. Ten je pro kladnou funkci definován jako obsah plochy¹¹ pod jejím grafem. Na obrázku vlevo je graf funkce a k němu je na obrázku vpravo vyšrafovaná plocha pod ním.

¹¹Terminologická poznámka: na střední škole se zpravidla rozlišuje mezi *plochou* a jejím *obsahem*. Plocha je množina, například čtverec a obsah je číslo. Ve vysokoškolských učebnicích je běžné termínem plocha označovat její obsah, tedy číslo. My se v textu budeme držet středoškolské terminologie.



Její obsah odhadneme zdola a shora obsahem plochy, jejíž obsah umíme spočítat. Jsou to mnohoúhelníky se stranami rovnoběžnými se souřadnými osami, jejich příklady vidíte na obrázku vlevo.

Obsah obdélníků pod grafem (jsou vyšrafovány modře) nazýváme *dolním Riemannovým integrálním součtem*. Obsah obdélníků nad grafem nazýváme *horním Riemannovým integrálním součtem*. Libovolný dolní integrální součet je nejvýše roven hornímu integrálnímu součtu.

Odtud a z lemmatu pak plyne, že supremum dolních integrálních součtů je nejvýše roven infimu horních integrálních součtů. Pokud se sobě rovnají, budeme jejich společnou hodnotu nazývat *riemannovým integrálem* zadané funkce na zadaném intervalu. Ukážeme si, že spojité omezené funkce mají na omezeném intervalu Riemannův integrál. Ukážeme si ale také příklad funkce, jejíž dolní Riemannův integrál je menší než horní Riemannův integrál. Tato funkce tedy nemá Riemannův integrál.

Kapitola 4

Aritmetika a funkce

Budeme se zabývat funkcemi, k jejichž definici stačí aritmetické operace. Jsou to polynomy¹ a podíly polynomů². Na těchto funkcích vyložíme vlastnosti funkcí jako sudost, lichost, monotonii a řekneme, co je obor hodnot funkce.

Dále se budeme zabývat inverzní funkcí. Vysvětlíme, jak souvisí inverzní funkce s rovnicí s parametrem. Speciálně budeme pomocí inverzní funkce definovat odmocniny.

4.1 Mocniny s přirozeným exponentem

Zápis $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \times}$ můžeme chápat jako zkratku. Tato zkratka vede přímočaře k následující definici a^n pro $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

$$a^1 = a \quad \text{a pro } n \geq 2 \quad a^n = a \cdot a^{n-1} \quad (4.1)$$

Číslo a nazýváme *základem* mocniny a číslo n *exponentem*.

Funkci $x \mapsto x^n$ nazýváme *mocninnou funkcí*.³ V celém článku (4.1) budeme uvažovat mocninné funkce jen s kladnými přirozenými exponenty.


4.1.1 Grafy mocninných funkcí

Na následujících obrázcích jsou grafy mocninných funkcí. Vlevo plnou čarou pro exponent $n = 2$ a čárkovanou pro $n = 3$.

¹Český termín pro polynomy je mnohočleny.

²Podíly polynomů nazýváme racionálními funkcemi.

³Funkci $x \mapsto a^x$ nazýváme exponenciální funkcí.




Uprostřed černě pro $n = 4$, modře pro $n = 5$ a červeně pro $n = 6$. Vpravo černě pro $n = 10$, modře pro $n = 21$ a červeně pro $n = 100$.

Všechny mocninné funkce jsou definované na množině reálných čísel (tj. jejich definiční obor je \mathbb{R}).

4.1.2 Sudost, lichost


Pro sudé n je $(-x)^n = x^n$.

Na grafu se tato vlastnost projeví jako symetrie vzhledem k ose y :
leží-li bod $[x, y]$ na grafu funkce,
pak i bod $[-x, y]$ leží na grafu funkce.



Pro liché n je $(-x)^n = -x^n$.

Na grafu se tato vlastnost projeví jako symetrie vzhledem k počátku:
leží-li bod $[x, y]$ na grafu funkce,
pak i bod $[-x, -y]$ leží na grafu funkce.



Tyto vlastnosti mocninných funkcí vedou k definici sudé a liché funkce.

Definice sudé funkce. Funkci f nazveme *sudou funkcí*, pokud pro každé x

z jejího definičního oboru platí: f je definovaná v $-x$ a $f(-x) = f(x)$.
Po označení definičního oboru funkce f symbolem D definici formálně zapíšeme

$$(\forall x \in D)(-x \in D \wedge f(-x) = f(x))$$

Často místo logické spojky „a zároveň“ \wedge píšeme čárku

$$(\forall x \in D)(-x \in D, f(-x) = f(x))$$

Definice liché funkce. Funkci f nazveme *lichou funkcí*, pokud pro každé x z jejího definičního oboru platí: f je definovaná v $-x$ a $f(-x) = -f(x)$.
Definici formálně zapíšeme

$$(\forall x \in D)(-x \in D, f(-x) = -f(x))$$

4.1.3 Monotonie

V kapitole o číslech 3.3, lemma o umocňování nerovností, jsme ukázali, že pro nezáporná a, b splňující $a < b$ a přirozené kladné n platí $a^n < b^n$. Toto tvrzení lze zapsat pomocí implikace

$$\text{pro kladné přirozené } n \text{ platí } (\forall a, b \in [0, +\infty))(a < b \implies a^n < b^n)$$

Níže připomeneme definici funkce rostoucí na množině. Výše uvedený výrok znamená, že mocninná funkce je rostoucí na intervalu $[0, +\infty)$.

Definice rostoucí funkce. Řekneme, že je funkce f *rostoucí na množině* $M \subseteq \mathbb{R}$, pokud platí

$$(\forall x_1, x_2 \in M)(x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$$

Ukážeme, že pro lichý exponent je mocninná funkce rostoucí na \mathbb{R} . Máme tedy ukázat platnost výroku

$$(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R})(x_1 < x_2 \implies x_1^n < x_2^n)$$

Rozebereme postupně čtyři případy: 1) $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 2) $x_1 \in (-\infty, 0)$, $x_2 \in [0, +\infty)$ 3) $x_1 \in [0, +\infty)$, $x_2 \in (-\infty, 0)$ 4) $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$

První případ jsme rozebrali výše.

V druhém případě je pravdivý i předpoklad $x_1 < x_2$ i závěr $x_1^n < x_2^n$ implikace, takže je implikace pravdivá.

Ve třetím případě není pravdivý ani předpoklad ani závěr implikace a implikace je tedy pravdivá.

Rozebereme čtvrtý případ:

Je-li $x_1 < x_2$, je $-x_2 < -x_1$ a $-x_1, -x_2 \in (0, +\infty)$. Protože je mocninná funkce na $(0, +\infty)$ rostoucí, plyne odtud $(-x_2)^n < (-x_1)^n$. Pro lichý exponent upravíme na $-(x_2^n) < -(x_1^n)$ a dále na $x_1^n < x_2^n$.

Proto pro $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ platí implikace $x_1 < x_2 \implies x_1^n < x_2^n$.

Úkoly.

1. Ukažte, že pro sudé n platí

$$(\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0])(x_1 < x_2 \implies x_1^n > x_2^n)$$

Funkci splňující tento výrok nazýváme *klesající na množině* $(-\infty, 0]$.

2. Napište definici funkce klesající na množině M .

4.1.4 Obor hodnot

Ze střední školy víte, že mocninné funkce mají pro lichý exponent obor hodnot roven množině reálných čísel a pro sudý exponent množině nezáporných reálných čísel. My se zde zamyslíme, co tato tvrzení znamenají. Nejdříve připomeneme definici oboru hodnot funkce.

Definice oboru hodnot. Pro funkci f s definičním oborem D nazýváme *oborem hodnot* množinu jejích funkčních hodnot, tedy množinu


$$H(f) = \{f(x) : x \in D\}$$

Jak zjistíme z grafu funkce, že číslo $a \in \mathbb{R}$ leží v oboru hodnot funkce? Sestrojíme přímkou o rovnici $y = a$ a zjistíme, zda má s grafem společný alespoň jeden bod. Pokud ano, pak je a prvkem oboru hodnot funkce.⁴


Na obrázku je graf funkce $x \mapsto x^2$ a přímkou o rovnici $y = a$ pro $a > 0$. Průsečík grafu⁵ a přímky má x -ovou souřadnici vyhovující rovnici $x^2 = a$.

⁴A pokud ne, tak a není prvkem oboru hodnot.

⁵Grafem je parabola.



Na následujících obrázcích bychom rádi zpochybnili samozřejmost existence takových průsečíků. Bude nás zajímat, co se stane, zvětšíme-li výřez s průsečíkem, jako na obrázku vpravo nahoře. Když budeme uvažovat nějaký hmotný objekt, třeba papír, na kterém právě čtete tyto řádky⁶, tak z fyziky víte, že pro naše oči a náš hmat pevná hmota se při velkém zvětšení přemění na malinké atomy, které se skládají z ještě mnohem menšího jádra obklopeného prázdnem vyplněným ještě menšími elektrony.⁷ Nemůže se stát něco podobného při zvětšení okolí průsečíku?



Na obrázcích je vyznačeno, co by se mohlo při zvětšení stát: na levém je v grafu mezera okolo přímky $y = a$ a přímka tedy s grafem nemá průsečík. Na obrázku vpravo sice mezera není, ale v grafu chybí právě ten bod, ve

⁶případně elektronické zařízení, ze kterého čtete

⁷Zjistěte kolikrát je atomové jádro menší než atom.

kterém by se s ním přímka protнула.

V následujícím textu ukážeme, že pro mocninnou funkci při sebevětším zvětšení ani jeden z obrázků nenastane. Důsledkem bude existence průsečíku a tedy existence odmocniny.

4.1.5 Spojitost

Ukážeme, že v grafu mocninné funkce nemůže vzniknout mezera. Upravíme rozdíl funkčních hodnot


$$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + ab^{n-2} + \dots + a^{n-1})$$

Budeme uvažovat a, b z intervalu $I = [0, M]$. Pak je

$$b^{n-1} + ab^{n-2} + \dots + a^{n-1} \leq nM^{n-1}$$

Budeme předpokládat, že $a < b$ a nerovnici vynásobíme kladným rozdílem $b - a$. Dostaneme

$$b^n - a^n \leq nM^{n-1}(b - a)$$



Volbou dostatečně malého $b - a$ můžeme udělat $b^n - a^n$ dostatečně malé. Konkrétně pro $b - a = \frac{\varepsilon}{nM^{n-1}}$ dostaneme $b^n - a^n \leq \varepsilon$. Proto nemůže nastat situace na obrázku.

Co když je v grafu mezera nulové velikosti? Ukážeme, že taková situace nastane, pokud za čísla považujeme jen čísla racionální a naopak nenastane při použití čísel reálných.

4.1.6 Mocninná funkce na racionálních číslech

Připomínáme, že racionální čísla jsou podíly celých čísel. Mezi racionální čísla patří i čísla celá, například číslo dva můžeme napsat ve tvaru podílu jako $2/1$.


Budeme hledat vzor čísla 2 funkce druhá mocnina v množině racionálních čísel, tedy budeme hledat dvojici celých čísel p, q splňující

$$(p/q)^2 = 2$$

Úpravou dostaneme

$$p^2 = 2q^2$$

Na pravé straně rovnice je sudé celé číslo, proto musí být sudé číslo i na levé straně, a proto musí být i číslo p sudé⁸.



Odtud plyne, že lze p vyjádřit jako dvojnásobek celého čísla r

$$p = 2r$$

dosazením $p^2 = 4r^2$ a pokrácením dvěma dostaneme

$$2r^2 = q^2$$

odkud podobnou úvahou plyne, že je i číslo q sudé.

Došli jsme tedy v závěru, že obě čísla v podílu $p/q = 2$ musí být sudá. To je ale ve sporu s tím, že každé racionální číslo je možné vyjádřit ve zkráceném tvaru tak, že je číselník nesoudělný s jmenovatelem.

Odtud plyne, že neexistuje dvojice celých čísel splňující $(p/q)^2 = 2$.

4.1.7 Reálná čísla a odmocnina

V minulém odstavci jsme ukázali, že v množině racionálních čísel nemá rovnice řešení, tedy neexistuje racionální číslo q splňující $q^2 = 2$. Z toho důvodu zavádíme reálná čísla. Názorně můžeme reálná čísla definovat pomocí vzájemně jednoznačné korespondence s body na přímce – zadáme na přímce polohu nuly a jedničky, a pak každému bodu na přímce odpovídá právě jedno reálné číslo a každému reálnému číslu odpovídá právě jeden bod na přímce. Takovou korespondenci v matematice nazýváme *vzájemně jednoznačným zobrazením*.

Definice vzájemně jednoznačné funkce – bijekce. Funkci f nazveme *vzájemně jednoznačným zobrazením* množiny $D \subseteq \mathbb{R}$ na množinu $H \subseteq \mathbb{R}$, pokud ke každému $y \in H$ existuje právě jedno $x \in D$ splňující $f(x) = y$ a ke každému $x \in D$ existuje právě jedno $y \in H$ splňující $f(x) = y$. Vzájemně

⁸Kdyby bylo p liché, bylo by liché i p^2 .

jednoznačné zobrazení také někdy nazýváme *bijekcí* množiny D na množinu H .

Úloha. Rozmyslete si, že každé vzájemně jednoznačné zobrazení je také prostým zobrazením.

Poznámka. Jiný způsob zavedení reálných čísel je pomocí jejich nekonečného desetinného rozvoje. Upozorníme na překvapivou skutečnost, že zobrazení množiny reálných čísel na množinu nekonečných desetinných rozvoju není vzájemně jednoznačné. Například číslu jedna odpovídají dva různé desetinné rozvoje $1.\bar{0}$ a $0.\bar{9}$.

TODO: SOUVISLOST S VLASTNOSTÍ SUPREMA (Zkratka TODO znamená, že text není kompletní a bude později doplněn.)

4.2 Odmocniny

Definice odmocniny z nezáporného čísla. Pro $a \in [0, +\infty)$ a sudé $n \geq 2$ definujeme *n-tou odmocninu z a* jako nezáporný kořen rovnice $x^n = a$. Značíme ji $\sqrt[n]{a}$. Pro $n = 2$ zpravidla značíme stručněji \sqrt{a} a vynecháváme přívlástek druhá.

Úkoly.

1. Načrtněte graf funkce $x \mapsto x^2$ a určete graficky druhou odmocninu z pěti.
2. Ukažte, že je odmocnina z pěti definovaná jednoznačně a vysvětlete, jak to plyne z monotonie mocninné funkce.

Definice odmocniny lichého stupně. Pro $a \in \mathbb{R}$ a liché $n \geq 3$ definujeme *n-tou odmocninu z a* jako kořen rovnice $x^n = a$. Značíme ji $\sqrt[n]{a}$.

Úkoly.

1. Načrtněte pro vhodné n graf funkce $x \mapsto x^n$ a zvolte reálné číslo a a určete graficky *n-tou odmocninu z a*. Volte sudé i liché n a ke každému n kladné, záporné i nulové a .
2. Ukažte, že odmocnina je definovaná jednoznačně a vysvětlete, jak to plyne z monotonie mocninné funkce.
3. Načrtněte grafy funkcí $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ pro $n = 2, 3, 4, 5$.

4.3 Inverzní funkce

V předchozím odstavci jsme definovali odmocninu z a jako kořen rovnice $x^n = a$ s neznámou x a parametrem a . Funkci této vlastnosti nazýváme inverzní funkcí.

Definice inverzní funkce. Necht' je zadaná funkce f . Řekneme, že k ní existuje inverzní funkce, pokud má rovnice $y = f(x)$ nejvýše jeden kořen. Funkci, která y přiřadí tento kořen, nazýváme *inverzní funkcí* k funkci f a značíme ji f^{-1} .

V definici inverzní funkce je podstatné, že rovnice $y = f(x)$ má nejvýše jeden kořen. Takovou funkci nazýváme *prostou funkcí*.

Definice prosté funkce. Funkci f nazveme *prostou funkcí*, pokud pro každou dvojici x_1, x_2 z jejího definičního oboru platí implikace

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$


Lemma o jednoznačnosti vzorů prosté funkce. Necht' je funkce f prostá. Pak má rovnice $f(x) = a$ s neznámou x a parametrem a pro libovolné $a \in \mathbb{R}$ nejvýše jeden kořen.

DŮKAZ. Jsou-li $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ kořeny rovnice $f(x) = a$, pak platí $f(x_1) = f(x_2)$. Protože předpokládáme, že je funkce f prostá, plyne odtud $x_1 = x_2$. Proto má rovnice $f(x) = a$ nejvýše jeden kořen.


Důsledek. Je-li f prostá funkce, pak má rovnice $f(x) = a$ jeden kořen pro a z oboru hodnot funkce f a nemá žádný kořen pro ostatní a .

4.3.1 Odmocnina jako inverzní funkce

Z minulých odstavců plyne, že funkce třetí odmocnina je inverzní funkcí třetí mocniny. Na obrázcích uvádíme jejich grafy.



Jiné je to v případě druhé odmocniny, protože funkce druhá mocnina nemá inverzní funkci. Změníme-li ale vhodně její definiční obor, pak inverzní funkci mít bude. Na obrázku je plnou čarou graf druhé mocniny se změněným definičním oborem a graf funkce k ní inverzní – druhé odmocniny.



Ještě uvedeme formální definici výše zmíněných pojmů.

Definice zúžené a rozšířené funkce. Pokud pro funkci f s definičním oborem $D(f)$ a funkci g s definičním oborem $D(g)$ platí $D(f) \subseteq D(g)$ a pro všechna $x \in D(f)$ platí $f(x) = g(x)$, pak nazýváme funkci f *zúžením funkce g na množinu $D(f)$* . Značíme $f = g|_{D(f)}$. Funkci g nazýváme *rozšířením funkce f na množinu $D(g)$* .

Příklad. Uvažujme funkce $g : x \mapsto x^2, x \in \mathbb{R}$ (tedy definičním oborem g je množina reálných čísel \mathbb{R}) a $f : x \mapsto x^2, x \in [0, +\infty)$ (tedy definičním oborem

f je interval $[0, +\infty)$. Pak je f zúžením g na interval $[0, +\infty)$, formálně zapsáno $f = g|_{[0, +\infty)}$.

Druhá odmocnina je inverzní funkcí k této zúžené funkci.

4.4 Polynomy

TODO: Definice, stupeň, nulový polynom, kořen polynomu, dělení polynomů, rozklad polynomu na kořenové činitele. Nerozložitelné polynomy v oboru komplexních čísel, v oboru reálných čísel. Maximální počet kořenů polynomu, rovnost polynomů. (Zkratka TODO znamená, že text není kompletní a bude později doplněn.)

Nerozložitelné polynomy v komplexním oboru jsou lineární polynomy (viz přednáška z algebry). Nerozložitelnými polynomy v reálném oboru jsou i některé kvadratické polynomy – viz články 16.1., 16.2. z dodatku o komplexních číslech.

Otázky. Kolik reálných kořenů může mít kvadratická rovnice? Kolik kubická rovnice? Kolik rovnice s polynomem stupně nejvýše pět s reálnými koeficienty a_0, \dots, a_5 ?

$$a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

Kolik rovnice s polynomem stupně nejvýše n s reálnými koeficienty a_0, \dots, a_n ?

$$a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$$

Otázka. Kolik kořenů $x \in \mathbb{R}$ má rovnice v závislosti na hodnotách a, b ? Má pro nějaké hodnoty a, b více jak jeden kořen?

$$ax + b = 0$$

Otázka. Který z následujících polynomů nelze v reálném oboru rozložit na součin polynomů nižších stupňů? Takovým polynomům budeme říkat nerozložitelné polynomy.

$$x^2 + x + 1 \quad x^2 - x - 1 \quad x^3 + 1 \quad x^4 + 1$$

Úkol. Upravte polynomy na součin v reálném oboru nerozložitelných polynomů.

$$x^3 + 8 \quad x^5 - 32 \quad x^3 + 2x - 3 \quad x^8 - 1$$

4.5 Racionální funkce

TODO: Definice, ryze lomená racionální funkce. Parciální zlomky, rozklad racionální funkce na součet polynomu a parciálních zlomků. (Zkratka TODO znamená, že text není kompletní a bude později doplněn.)

Úkoly. Vyjádřete výrazy jako součet polynomu a parciálních zlomků.

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} \quad \frac{-x^2 + 2}{x^2 - 1} \quad \frac{3x^2 + x + 2}{x^3 - 4x + 3} \quad \frac{1}{x^3(x^2 + 1)} \quad \frac{x^3}{(x^2 + x + 3)^2}$$

Kapitola 5

Cvičení na funkce a jejich grafy

Cílem této kapitoly je procvičit pojmy vyložené v předchozích kapitolách a především upozornit na jejich vzájemné souvislosti.

5.1 Rovnice s parametrem

Začneme s dvěma funkcemi, jejichž grafy umíme nakreslit


$$g : x \mapsto x^2 + 3x - 1 \quad h : x \mapsto \frac{x - 3}{2x + 1}$$

a ukážeme, jak řešit, nejdříve graficky a poté i početně, rovnice s neznámou x a parametrem y . Z výsledků pak určíme obor hodnot funkce a pokud existuje, tak i inverzní funkci.

$$x^2 + 3x - 1 = y \tag{5.1}$$

$$\frac{x - 3}{2x + 1} = y \tag{5.2}$$

5.1.1 Grafické řešení rovnice s parametrem




Vlevo jsou spolu s parabolou

$$y = x^2 + 3x - 1$$

čárkovaně přímky o rovnicích

$$y = \text{konstanta}$$

Hodnoty konstanty na pravé straně rovnice jsme vybrali tak, aby měla rovnice (5.1) dva kořeny, jeden kořen a žádný kořen. Každému z kořenů odpovídá průsečík přímky s parabolou.



Vlevo je k hyperbole

$$y = \frac{x - 3}{2x + 1}$$

nakreslena asymptota $y = 1/2$. Pro toto ypsilon nemá rovnice (5.2) řešení – přímka (asymptota) se s hyperbolou neprotíná.

Přímky pro ostatní hodnoty ypsilon (na obrázku $y = -1/2$ a $y = 3/2$) se s hyperbolou protínají v jednom bodě.

5.1.2 Početní řešení rovnic s parametrem

Při řešení rovnic budeme postupovat obdobně jako v případě konkrétního čísla na pravé straně rovnice.

U rovnice (5.1) nejdřív převedeme pravou stranu rovnice nalevo

$$x^2 + 3x - 1 - y = 0$$

Dostali jsme kvadratickou rovnici s diskriminantem

$$D = 3^2 - 4(-1 - y),$$

po úpravě

$$D = 13 + 4y$$

Víme, že kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny v případě $D > 0$, tedy v případě $y > -13/4$. Jeden reálný kořen má v případě $D = 0$, tedy $y = -13/4$ a v případě $D < 0$, tedy $y < -13/4$ nemá žádný reálný kořen.

Kořeny vypočteme dosazením do vzorce. Dostaneme

Pro $y > -13/4$ má rovnice kořeny

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13 + 4y}}{2}$$

Pro $y = -13/4$ má rovnice kořen

$$x = -3/2$$

Pro $y < -13/4$ nemá rovnice žádný kořen.

Výsledek výpočtu se shoduje s grafickým řešením, navíc jsme našli souřadnice vrcholu paraboly a tím i obor hodnot funkce g

$$H(g) = [-13/4, +\infty)$$

Rovnici (5.2) vynásobíme jmenovatelem. Dostaneme¹

$$x - 3 = y(2x + 1)$$

Na pravé straně roznásobíme závorku

$$x - 3 = 2xy + y$$

Výrazy obsahující neznámou x převedeme na levou stranu, ostatní výrazy na stranu pravou a na levé straně vytkneme x

$$x(1 - 2y) = y + 3$$

¹Po vyřešení rovnice bychom správně měli ověřit, že získaný kořen splňuje i rovnici před úpravou – tedy že $x \neq -1/2$, pro které má jmenovatel nulovou hodnotu. Zde si stačí uvědomit, že pro $x = -1/2$ je $x - 3 \neq 0 = y(2x + 1)$.

Pro $1 - 2y = 0$, tedy $y = 1/2$ dostaneme rovnici $0 = 7/2$, která nemá řešení. Pro ostatní y dostaneme kořen rovnice vydělením nenulovým výrazem $1 - 2y$

Výsledek tedy shrneme konstatováním, že pro $y \neq 1/2$ má rovnice jeden kořen

$$x = \frac{y + 3}{1 - 2y}$$

a pro $y = 1/2$ nemá žádný kořen.

Výsledek výpočtu se shoduje s grafickým řešením, navíc jsme našli předpis inverzní funkce

$$h^{-1} : y \mapsto \frac{y + 3}{1 - 2y}, \quad y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

5.2 Další příklady na rovnice s parametrem

V kapitole 5.1 jsme řešili rovnice s parametrem jednoduché natolik, že jsme je uměli vyřešit počtově i graficky a výsledky jsme porovnali. Zde se budeme věnovat složitějším rovnicím a graf, který uvedeme na závěr, odvodíme z našeho výpočtu. Úmyslně volíme takové funkce, při kterých budeme řešit kvadratickou rovnici s parametrem.

5.2.1

$$y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$$

Rovnici vynásobíme jmenovatelem, všechny členy převedeme na jednu stranu a upravíme do tvaru kvadratické rovnice. Dostaneme

$$x^2 + x(-y - 3) + (1 - 2y) = 0 \tag{5.3}$$

Diskriminant této kvadratické rovnice je

$$D = (-y - 3)^2 - 4(1 - 2y)$$

a po úpravě

$$D = y^2 + 14y + 5$$

Počet kořenů rovnice (5.3) dostaneme vyřešením kvadratické rovnice $D = 0$ a nerovnice $D > 0$.

Pro $y = -7 \pm \sqrt{44}$ má rovnice (5.3) jeden kořen. Dosazením do vzorce pak dostaneme, že tento kořen je $x = (y + 3)/2$, a tedy

$$\begin{aligned} \text{pro } y_1 = -7 + \sqrt{44} \quad & \text{je } x_1 = -2 + \sqrt{11} \\ \text{pro } y_2 = -7 - \sqrt{44} \quad & \text{je } x_2 = -2 - \sqrt{11} \end{aligned}$$

Pro $y \in (-\infty, -7 - \sqrt{44}) \cup (-7 + \sqrt{44}, +\infty)$ má rovnice (5.3) dva kořeny

$$x = \frac{y + 3 \pm \sqrt{y^2 + 14y + 5}}{2}$$

Pro ostatní y rovnice nemá řešení.


Z našich výpočtů zjistíme, že funkce není prostá, nemá tedy inverzní funkci a její obor hodnot je $(-\infty, -7 - \sqrt{44}] \cup [-7 + \sqrt{44}, +\infty)$. Pomocí $y_{1,2}$ tento obor hodnot zapíšeme $(-\infty, y_2] \cup [y_1, +\infty)$.

Výsledky ještě postupně vyneseme do grafu.

V grafu vlevo jsme vyznačili body $[x_1, y_1]$, $[x_2, y_2]$ a tečkovaně přímkou $x = -2$ (pro tuto hodnotu není funkce definovaná, graf proto vyznačenou přímku neprotíná).

V prostředním grafu jsme dále čárkovaně vyznačili y ležící v oboru hodnot funkce.

V pravém grafu jsme doplnili graf funkce.



Přesnější graf získáme vydělením


$$\frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2} = x - 5 + \frac{11}{x + 2}$$

Do grafu dokreslíme přímku o rovnici $y = x - 5$.

Pro velká kladná x je $11/(x + 2)$ malé kladné, a tedy graf funkce leží malý kousek nad touto přímkou.

Pro velká záporná x je $11/(x + 2)$ malé záporné, a tedy graf funkce leží malý kousek pod touto přímkou.

Pro úplnost uveďme, že grafem je v tomto případě hyperbola.



5.2.2

$$y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

První úprava rovnice je obdobná jako v minulém příkladě.

$$yx^2 - x + y = 0 \tag{5.4}$$

Pro $y = 0$ dostáváme rovnici $-x = 0$ s jedním kořenem.

Pro $y \neq 0$ dostáváme kvadratickou rovnici s diskriminantem

$$D = 1 - 4y^2$$

Rovnice $D = 0$ je splněná pro $y_1 = 1/2$ a pro $y_2 = -1/2$, nerovnice $D > 0$ je splněná pro $y \in (-1/2, 1/2)$. Kořeny kvadratické rovnice dostaneme dosazením do vzorce.

Rovnice tedy má

pro $y = -1/2$ kořen $x = -1$

pro $y \in (-1/2, 0)$ kořeny $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4y^2}}{2y}$

pro $y = 0$ kořen $x = 0$


pro $y \in (0, 1/2)$ kořeny $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4y^2}}{2y}$

pro $y = 1/2$ kořen $x = 1$

Pro ostatní y rovnice nemá řešení.

Odvodíme odsud, že funkce není prostá a nemá tedy inverzní funkci a její obor hodnot je $[-1/2, 1/2]$.

Výsledky opět vyneseme postupně do grafu.



Na obrázku vlevo jsme vynesli tři body grafu a čárkovaně vyznačili obor hodnot. Na pravém obrázku je graf funkce.

5.3 Limity

Při kreslení grafu v příkladu 5.2.1 jsme vydělili mnohočleny

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2} = x - 5 + \frac{11}{x + 2} \quad (5.5)$$

a pomohli si dále úvahou o hodnotách zlomku $11/(x + 2)$ pro x blízké minus dvěma nebo velké kladné i záporné.

Později zavedeme pojem limity a budeme říkat, že hodnota výrazu $11/(x + 2)$ se pro x blíží se

ke dvěma zprava se blíží k plus nekonečnu
ke dvěma zleva se blíží k minus nekonečnu
k plus nekonečnu se blíží k nule
k minus nekonečnu se blíží k nule

Nebo také budeme říkat, že limita výrazu ... je pro x jdoucí k ... rovna ...

Formálně budeme x blíží se ke dvěma zprava zapisovat $x \rightarrow 2^+$ a x blíží se ke dvěma zleva $x \rightarrow 2^-$. Podobně x blíží se k plus nekonečnu zapíšeme $x \rightarrow +\infty$ a k minus nekonečnu $x \rightarrow -\infty$.

Výroky napsané výše slovně pak zapíšeme: $11/(x+2) \rightarrow +\infty$ pro $x \rightarrow 2^+$, a podobně ostatní.

Podobně bychom v příkladu 5.2.2 mohli upravit

$$\frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{x + \frac{1}{x}}$$

a odtud usoudit, že pro velká x budou funkční hodnoty malé kladné a pro velká záporná x budou malé záporné a říkat tedy, že limita tohoto výrazu je pro x jdoucí k plus a minus nekonečnu rovná nule.

V další kapitole budeme zkoumat funkce

$$x \mapsto \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1} \quad (5.6)$$


$$y \mapsto \frac{y^2}{4y - 2} \quad (5.7)$$

Rozebereme zde chování těchto funkcí v okolí kořenů jmenovatele a v okolí obou nekonečen.

Při zkoumání funkce z (5.7) začneme úpravou

$$\frac{y^2}{4y - 2} = y^2 : (4y - 2) = \frac{1}{4}y + \frac{1}{8} + \frac{1}{16y - 8}$$

Protože je zde y nezávisle proměnná, prohodíme osy, tedy vodorovně nakreslíme osu y a svisle osu x .



Na obrázku vlevo je tečkovaně nakreslená přímka $x = y/4 + 1/8$ a přímka $y = 1/2$. Plnou čarou je vyznačena závislost x na y na základě úvahy: k $y/4 + 1/8$ přičítáme $1/(16y - 8)$ a to je pro $y \rightarrow -\infty$ malé záporné, pro $y \rightarrow 1/2^-$ velké záporné, pro $y \rightarrow 1/2^+$ velké kladné a pro $y \rightarrow +\infty$ malé kladné.

Při zkoumání funkce z (5.6) spočítáme limity zprava a zleva v bodech ± 1 a $\pm\infty$.

Pro x o málo větší než jedna je čitatel $x^2 + 2x$ zhruba roven třem a jmenovatel je kladný s hodnotou blízkou nule. Zlomek má tedy velkou kladnou hodnotu. Formálně tuto úvahu zapíšeme: $\frac{x^2+2x}{x^2-1} \rightarrow +\infty$ pro $x \rightarrow 1^+$

Pro $x \rightarrow 1^-$ je jmenovatel malý záporný, a proto $\frac{x^2+2x}{x^2-1} \rightarrow -\infty$.

Graf pro x hodně velká ($x \rightarrow +\infty$ a $x \rightarrow -\infty$) získáme následující úvahou: zlomek rozšíříme výrazem $1/x^2$ (stejnou úpravu lze udělat vytknutím


x^2) a upravíme

$$\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1} = \frac{\frac{1}{x^2}(x^2 + 2x)}{\frac{1}{x^2}(x^2 - 1)} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Pro velká x je čítec i jmenovatel přibližně roven jedné, tedy $\frac{x^2+2x}{x^2-1} \rightarrow 1$.

Pro velká kladná x ještě můžeme doplnit: čítec je o trochu větší než jedna a jmenovatel o trochu menší než jedna, proto má zlomek hodnotu o trochu větší než jedna. Pro x velká záporná obdobnou úvahu nelze provést, dělíme dvě čísla o trochu menší než jedna a výsledek tedy může být i větší i menší než jedna.

Na následujícím obrázku jsou plnými čarami znázorněny výsledky našich úvah.



Ze spojitosti vyšetřované funkce plyne, že rovnice (5.8) má pro libovolné číslo y kořen $x \in (-1, 1)$. Pro $y < 1$ má pak ještě jeden kořen $x \in (-\infty, -1)$ a pro $y > 1$ kořen $x \in (1, +\infty)$. Kořenů může být i více, pokud by funkce nebyla na uvedených intervalech monotonní.

V následující kapitole ukážeme, že kořenů více není. Zjistíme tak, že je funkce na intervalech $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, \infty)$ klesající a její graf tedy vypadá jako výše uvedená tečkovaná křivka.

5.4 Další příklady na rovnice s parametrem

5.4.1

Probereme funkci, jejíž limity jsme spočítali v předchozí kapitole. Řešení rovnice s parametrem nám pomůže části grafu spojit.

$$y = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1} \quad (5.8)$$

Začneme obdobnými úravami jako v předchozích příkladech

$$x^2(y - 1) - 2x - y = 0$$

Pro $y = 1$ dostáváme rovnici $-2x - 1 = 0$ s kořenem $x = -1/2$.

Pro $y \neq 1$ dostáváme kvadratickou rovnici s diskriminantem

$$D = 4 + 4y(y - 1)$$

který nabývá kladných hodnot pro všechny reálné hodnoty y . Rovnice má tedy pro $y \neq 1$ dva kořeny

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{y^2 - y + 1}}{y - 1}$$

Z výpočtů plyne, že obor hodnot funkce je množina reálných čísel \mathbb{R} , funkce není prostá a nemá tedy inverzní funkci.

Graf jsme uvedli nahoře včetně úvah opírajících se o výsledky výpočtu.

Úkol. Nechte WolframAlpha vykreslit grafy funkcí

$$x \mapsto \frac{1 + \sqrt{x^2 - x + 1}}{x - 1} \quad x \mapsto \frac{1 - \sqrt{x^2 - x + 1}}{x - 1}$$

a porovnejte s výše uvedeným grafem.

NÁVOD. Použijte příkaz `Plot((1+sqrt(x*x-x+1))/(x-1))`.

5.4.2

Uvedeme ještě jeden příklad, ve kterém při řešení rovnice budeme umocňovat. Vysvětlíme, proč se o takové úpravě říká, že není ekvivaletní. Dále v příkladech zopakujeme pojmy prostá a inverzní funkce a souvislosti.

$$y = 2x + \sqrt{4x^2 - 2x}$$

Osamostatníme odmocninu a umocníme

$$y - 2x = \sqrt{4x^2 - 2x} \quad (5.9)$$

$$(y - 2x)^2 = 4x^2 - 2x \quad (5.10)$$

$$y^2 - 4xy + 4x^2 = 4x^2 - 2x$$

Všimněte si, že kvadratický člen $4x^2$ se odečte a dostaneme lineární rovnici

$$y^2 = 4xy - 2x$$

$$y^2 = x(4y - 2)$$

$$x = \frac{y^2}{4y - 2}$$

Pro $y = 1/2$ nemůžeme udělat poslední úpravu. Pro toto y má rovnice před úpravou tvar $1/4 = 0$, nemá tedy řešení. Pro $y \neq 1/2$ jsme dostali kořen $x = y^2/(4y - 2)$.

Během řešení rovnice jsme při úpravě (5.9) na (5.10) umocňovali. V případě, že se strany rovnice před úpravou liší znaménkem, například $L = y - 2x = -2$, $P = \sqrt{4x^2 - 2x} = 2$, není rovnice splněna. Po úpravě rovnice splněna je $(y - 2x)^2 = (-2)^2 = 4$, $4x^2 - 2x = 2^2 = 4$. Umocňování tedy může rozšířit množinu kořenů rovnice a je třeba ověřit, zda kořeny rovnice (5.10) vyhovují i rovnici (5.9). Obvykle ověřujeme dosazením kořenů do rovnice (zkouškou). My zde ukážeme jiný způsob ověření. Využijeme následující tvrzení (lemma).

Lemma. Pokud pro čísla $L, P \in \mathbb{R}$ platí $L^2 = P^2$, pak je buď $L = P$ nebo $L = -P$.

DŮKAZ je jednoduchý. $L^2 = P^2$ upravíme na $L^2 - P^2 = 0$ a dále na $(L - P)(L + P) = 0$ a odtud plyne, že buď je $L - P = 0$ nebo $L + P = 0$ a odtud plyne požadované tvrzení. \square

V našem případě je $P = \sqrt{4x^2 - 2x} \geq 0$. Proto stačí zjistit, zda je i $L = y - 2x \geq 0$. Potom nemůže nastat případ $L = -P$ a tedy z $L^2 = P^2$ plyne $L = P$.

Zjistíme tedy, zda platí $L \geq 0$. Dosazením a úpravami dostaneme

$$L = y - 2x = y - \frac{2y^2}{4y - 2} = y - \frac{y^2}{2y - 1} = \frac{y^2 - y}{2y - 1}$$

Vyřešením nerovnice $(y^2 - y)/(2y - 1) \geq 0$, dostaneme² $y \in [0, 1/2) \cup [1, +\infty)$.

ZÁVĚR: rovnice má pro $y \in [0, 1/2) \cup [1, +\infty)$ kořen $x = y^2/(4y - 2)$. Pro ostatní y nemá rovnice řešení.

Ještě jsme výše slíbili vysvětlit, proč používáme termín (ne)ekvivaletní úprava. Jak souvisí úprava s ekvivalencí? Při úpravách rovnice chceme, aby množina kořenů rovnice před úpravou byla totožná s množinou kořenů rovnice po úpravě. Pro konkrétní hodnotu proměnné se můžeme na každou z rovnic dívat jako na výrok. A rovnost množin kořenů znamená, že jsou výroky *ekvivalentní*. Odtud název ekvivaletní úprava.

Řešením rovnice jsme získali inverzní funkci k funkci³

$$f : x \mapsto 2x + \sqrt{4x^2 - 2x}, \quad x \in (-\infty, 0] \cup [1/2, +\infty) \quad (5.11)$$

Touto inverzní funkcí je⁴

$$f^{-1} : y \mapsto \frac{y^2}{4y - 2}, \quad y \in [0, 1/2) \cup [1, +\infty)$$

Naším dalším cílem je načrtnout grafy funkce f i inverzní funkce f^{-1} .

Začneme inverzní funkcí f^{-1} . V minulé kapitole jsme spočítali limity jejího rozšíření na množinu $\mathbb{R} \setminus \{1/2\}$.

$$g : y \mapsto \frac{y^2}{4y - 2}$$


a vynesli je do grafu. Vlevo dole jsme ho znovu nakreslili a tečkovanou přímkou znázorňili, že funkce g není prostá. Inverzní funkce f^{-1} , která je zúžením funkce g , prostá je. Pojd'me vytvořit její graf.

Definiční obor funkce f^{-1} jsme získali z podmínky $y \leq 2x$. Na obrázku vpravo jsme tuto podmínku vyřešili graficky a řešení znázornili plnou čarou.

²Vyřešení této nerovnice necháme na čtenáři.

³Definiční obor jsme určili z podmínek – odmocňujeme jen nezáporná čísla.


⁴Zde jsou definičním oborem ta y , pro něž má rovnice $y = f(x)$ řešení.



Sestrojený graf inverzní funkce lze považovat za plnohodnotný graf funkce f – pokud se v něm jako v grafu funkce f dokážeme orientovat. To si ověříme v následujícím cvičení.

Úkol. Zvolte v grafu funkce f^{-1} bod na ose x a na ose y vyznačte pro toto x hodnotu $f(x)$.

Pokud se vám nelíbí prohozené osy, můžete je vyměnit zpět. Na následujících obrázcích je vlevo graf funkce f a vpravo graf funkce k ní inverzní.⁵




Úkol. Vyřešte stejnou úlohu pro funkci h s opačným znaménkem před odmocninou

$$h : x \mapsto 2x - \sqrt{4x^2 - 2x}$$

⁵Pokud funkce f přiřadí proměnné x proměnnou y , pak inverzní funkce přiřadí naopak proměnné y proměnnou x . Na základních a středních školách je zpravidla vyžadováno u inverzní funkce přejmenování, my je zde neděláme, považujeme je za nepřínosné a naopak spíše matoucí.

a ukažte, že se liší jen znaménkem levé strany L před umocněním rovnice, a tedy graf funkce h a funkce h^{-1} k ní inverzní je⁶



⁶tečkovaně jsou zakresleny grafy funkcí f, f^{-1}

Kapitola 6

Dodatek – rovnice přímky, přímá úměra


Pravděpodobně víte, že grafem lineární funkce $f(x) = ax + b$ je přímka. Přemýšleli jste někdy, proč to tak je? Cílem dodatku je podívat se na rovnici přímky z různých stran a ukázat souvislost s přímou úměrou.

6.1 Motivační úlohy

6.1.1 Přímá úměra


Úloha. Vypočtete mzdu za 8 hodin práce, víte-li, že za 3 hodiny práce je odměna 500,- Kč.

Ze zadání spočítáme mzdu za jednu hodinu: $500/3$ Kč a vynásobíme ji počtem hodin. Dostaneme $4000/3 \doteq 1333$ Kč. Všimněte si, že rovnici přímé úměry $x/8 = 500/3$ odpovídají na grafu podobné trojúhelníky a podobným trojúhelníkům odpovídá přímka jako graf přímé úměry.



6.1.2 Podobnost trojúhelníků

V kapitole 2.1.2 jsme používali k výpočtu podobnost trojúhelníků. Z této kapitoly jsme zkopírovali obrázek, ve kterém jsme vyjadřovali x pomocí a , b , h . Vidíte ho vlevo a vpravo je zvětšený detail dvou podobných trojúhelníků s vyznačenými shodnými úhly.



Vztah mezi délkami stran trojúhelníků můžeme odvodit dvěma způsoby.

1. Podíl dvojice stran z jednoho trojúhelníku je roven podílu dvojice odpovídajících stran ve druhém trojúhelníku:

$$\frac{b}{a} = \frac{x}{h}$$

Zde jsou trojúhelníky navíc pravoúhlé, proto je tento podíl navíc roven $\text{tg } \varphi$.

2. Koeficient podobnosti je podíl velikosti obrazu a vzoru. Vyjádříme ho dvojitým způsobem:

$$k = \frac{x}{b} = \frac{h}{a}$$

V obou případech dostaneme

$$x = \frac{hb}{a}$$

6.1.3 Objem komolého kužele

V příkladu v kapitole 2.1.2 jsme použili vzorec pro objem komolého kužele. Ukážeme odvození tohoto vzorce.


Na obrázku vlevo je komolý kužel s vyznačenými rozměry. Vpravo jsme komolý kužel doplnili na kužel. Objem komolého kužele vypočteme jako rozdíl objemů většího a menšího kužele. Poloměry podstav obou těchto kuželů jsme označili r_1 , r_2 a předpokládáme, že je známe. Co neznáme, je výška x menšího kužele. Odvodíme ji z vyznačených podobných trojúhelníků – nahoře vidíme pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami x , r_2 , dole s odvěsnami h , $r_1 - r_2$. Trojúhelníky jsou podobné, protože odpovídající strany jsou rovnoběžné (odtud plyne rovnost odpovídajících úhlů).

Z podobnosti trojúhelníků plyne rovnost poměrů odpovídajících stran

$$\frac{x}{r_2} = \frac{h}{r_1 - r_2}$$

a odtud vyjádříme

$$x = \frac{r_2 h}{r_1 - r_2}$$



Menší kužel má poloměr podstavy r_2 a výšku x , má tedy objem

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi r_2^2 x = \frac{1}{3}\pi \frac{r_2^3 h}{r_1 - r_2}$$

Větší kužel má poloměr podstavy r_1 a výšku (část úpravy necháváme jako úkol pro čtenáře)

$$h + x = h + \frac{r_2 h}{r_1 - r_2} = \dots = \frac{r_1 h}{r_1 - r_2}$$

Objem většího kužele tedy je

$$V_2 = \frac{1}{3}\pi r_1^2 \frac{r_1 h}{r_1 - r_2} = \frac{1}{3}\pi \frac{r_1^3 h}{r_1 - r_2}$$

Objem komolého kužele vypočteme jako rozdíl objemů obou kuželů

$$V = V_2 - V_1 = \frac{1}{3}\pi \frac{r_1^3 h}{r_1 - r_2} - \frac{1}{3}\pi \frac{r_2^3 h}{r_1 - r_2} = \frac{1}{3}\pi \frac{(r_1^3 - r_2^3)h}{r_1 - r_2}$$

K další úpravě použijeme vzorec

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Po dosazení $a = r_1$, $b = r_2$ dostaneme

$$r_1^3 - r_2^3 = (r_1 - r_2)(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

a dále

$$\frac{r_1^3 - r_2^3}{r_1 - r_2} = \frac{(r_1 - r_2)(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)}{r_1 - r_2} = r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2$$

Dokončeme výpočet objemu V

$$V = \frac{1}{3}\pi \frac{(r_1^3 - r_2^3)h}{r_1 - r_2} = \frac{1}{3}\pi h \frac{r_1^3 - r_2^3}{r_1 - r_2} = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$$

Dostali jsme vzorec použitý v kapitole 2.1.2

$$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$$

6.1.4 Lineární interpolace


Níže vidíte tabulku obsahující naměřené hodnoty vybraných vlastností vody.¹ Vlastnosti vody se mění s teplotou a tabulka obsahuje hodnoty jen pro vybrané teploty. Představme si situaci, kdy potřebujeme odhadnout tyto vlastnosti pro teplotu, která v tabulce není obsažena.

2.4 Vlastnosti vody při tlaku 0,1 MPa

t [°C]	ρ [$\frac{kg}{m^3}$]	c_p [$\frac{J}{kg \cdot K}$]	λ [$\frac{W}{m \cdot K}$]	$10^6 \cdot \nu$ [$\frac{m^2}{s}$]	$10^3 \cdot \eta$ [Pa·s]	$10^3 \cdot \gamma$ [$\frac{1}{K}$]	Pr [-]
0	999,9	4 225,7	0,558	1,794	1,793 6	-0,07	13,57
5	1000,0	4 206,5	0,567	1,535	1,534 7	0,015	11,35
10	999,7	4 194,7	0,577	1,297	1,296 4	0,090	9,42
15	999,1	4 186,8	0,587	1,137	1,135 6	0,154	8,10
20	998,2	4 181,7	0,597	0,995	0,993 4	0,208	6,97
25	997,1	4 178,4	0,606	0,883	0,880 6	0,256	6,08
30	995,7	4 176,3	0,615	0,796	0,792 4	0,302	5,38
35	994,1	4 175,5	0,624	0,724	0,719 8	0,344	4,81
40	992,3	4 175,5	0,633	0,663	0,658 0	0,386	4,34
45	990,2	4 176,3	0,639	0,611	0,605 1	0,422	3,94
50	988,1	4 177,6	0,647	0,562	0,555 0	0,457	3,58
55	985,7	4 179,3	0,652	0,517	0,509 9	0,490	3,27
60	983,2	4 181,6	0,658	0,480	0,471 7	0,522	2,99
65	980,6	4 183,9	0,663	0,444	0,435 4	0,554	2,74
70	977,8	4 186,8	0,667	0,413	0,404 0	0,584	2,53
75	974,9	4 190,1	0,651	0,386	0,376 6	0,614	2,35
80	971,8	4 193,9	0,673	0,362	0,352 0	0,642	2,19
85	968,7	4 197,7	0,676	0,339	0,328 1	0,670	2,04
90	965,3	4 201,9	0,678	0,320	0,308 9	0,697	1,91
95	961,9	4 206,0	0,680	0,304	0,292 2	0,723	1,80
100	958,4	4 210,7	0,681	0,290	0,277 5	0,749	1,72

¹Tabulka je zkopírovaná z textu pro studenty fakulty strojní.

Budeme odhadovat hustotu vody při teplotě $T = 22^\circ\text{C}$ a tlaku $p = 0.1\text{MPa}$. V tabulce najdeme interval obsahující teplotu T a vyneseme hodnoty hustoty do grafu. Pro větší názornost jsme vynesli i hodnoty pro nejbližší okolní teploty.



Z tabulky je vidět, že hustota vody od teploty 5°C s rostoucí teplotou klesá.² Z bodů vnesených do grafu pak vidíme, že závislost hustoty na teplotě je v daném intervalu (tedy mezi 15°C a 30°C) přibližně lineární. To nás vede k použití metody nazvané lineární interpolace: Tabelované hodnoty proložíme lomenou čarou, tím jsme funkci vyjadřující závislost hustoty vody na teplotě nahradili po částech lineární funkcí. Hustotu vody pro teplotu $T = 22^\circ\text{C}$ pak můžeme odhadnout z grafu a pokud chceme dosáhnout větší přesnosti, tak hodnotu vypočteme. V dalším ukážeme, jak.


²Je to tak i mezi nula a deseti stupni? Jak se tento jev nazývá? Jak ovlivňuje zimní krajinu?

V následujícím grafu jsme označili teploty T_1 , T_2 a odpovídající hustoty ϱ_1 , ϱ_2 . Dále jsme do grafu vynesli teplotu T a jí odpovídající hustotu ϱ a v grafu jsme vyznačili strany dvou podobných trojúhelníků. Z podobnosti trojúhelníků plyne rovnost poměrů odpovídajících si stran

$$\frac{\varrho_1 - \varrho}{T - T_1} = \frac{\varrho_1 - \varrho_2}{T_2 - T_1}$$

Odtud vyjádříme ϱ : nejdříve rovnici vynásobíme jmenovatelem levé strany

$$\varrho_1 - \varrho = \frac{\varrho_1 - \varrho_2}{T_2 - T_1}(T - T_1)$$



a v dalším kroku vyjádříme ϱ (přičteme ϱ , odečteme pravou stranu a

vyměníme strany rovnice)


$$\varrho = \varrho_1 - \frac{\varrho_1 - \varrho_2}{T_2 - T_1}(T - T_1)$$

Případně ještě vytkneme mínus z výrazu $\varrho_1 - \varrho_2$ a převedeme rovnici do tvaru

$$\varrho = \varrho_1 + \frac{\varrho_2 - \varrho_1}{T_2 - T_1}(T - T_1) \quad (6.1)$$

6.1.5 Převod stupňů Celsia na stupně Fahrenheita

Teplotám nula a sto ve stupních Celsia odpovídají ve stupních Fahrenheita teploty $32^\circ F$, $212^\circ F$. Převod mezi těmito dvěma stupnicemi je lineární a naším cílem je tento převod odvodit.



Do grafu jsme vynesli teploty a k odvození opět použijeme podobnost trojúhelníků a z ní plynoucí rovnost poměrů stran. Dostaneme


$$\frac{T_F - 32}{T_C - 0} = \frac{212 - 32}{100 - 0}$$

a odtud po úpravách

$$T_F = 32 + 1.8 T_C \quad (6.2)$$

6.1.6 Sečna, tečna a Lagrangeova věta o střední hodnotě

Níže vidíte graf funkce f na intervalu $[a, b]$ – grafem je červená křivka. Do grafu jsme modrou barvou zakreslili sečnu grafu procházející body $[a, f(a)]$, $[b, f(b)]$.




Jedním z teoretických nástrojů, který budeme používat, je *Lagrangeova*³ věta o střední hodnotě, ve které tvrdíme, že v intervalu $[a, b]$ existuje bod, v němž je tečna ke grafu funkce rovnoběžná s touto sečnou.

³Podle matematika a astronoma Josepha Louise Lagrange (1736–1813), čteme lagranže, lagranžova věta.

Tento bod i s tečnou jsme nakreslili do následujícího obrázku. Při důkazu Lagrangeovy věty⁴ použijeme pomocnou funkci F , kterou získáme jako rozdíl hodnoty na sečně a funkční hodnoty funkce f . Do grafu jsme vyznačili hodnotu $F(x)$ pro x rovno c, d .

K výpočtu $F(x)$ potřebujeme rovnici sečny, kterou opět získáme použitím podobnosti trojúhelníků a odtud odvozeného vztahu

$$\frac{y - f(a)}{x - a} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (6.3)$$



Vyjádríme odtud y

$$y = f(a) + (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (6.4)$$

a odtud dostaneme vztah pro pomocnou funkci F

$$F(x) = y - f(x) = f(a) + (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f(x)$$

⁴Matematická věta je tvrzení, o jehož platnosti jsme se přesvědčili jeho důkazem.

6.1.7 Shrnutí


Cílem motivačních příkladů bylo ukázat souvislost pojmů *přímá úměra*, *podobnost trojúhelníků*, *lineární funkce*, *přímka jako graf přímé úměry*.

V další kapitole ještě jednou zopakujeme odvození rovnice přímky a přidáme další detaily.

6.2 Rovnice přímky

Odvodíme rovnici přímky určené dvěma různými body $A = [x_A, y_A]$, $B = [x_B, y_B]$.


Nejdřív probereme případ, ve kterém mají body A , B stejnou x -ovou souřadnici, tedy pro případ $x_A = x_B$. Přímka jimi určená je kolmá k ose x , není grafem žádné funkce a má rovnici $x = x_A$.



Dále probereme případ bodů, kdy je druhý vpravo nahoře od prvního – pro jejich souřadnice platí $x_A < x_B$, $y_A < y_B$. Na obrázku je kromě přímky AB ještě $X = [x, y]$ ležící na přímce mezi body A , B . Dále jsou na obrázku

vyznačeny dva podobné trojúhelníky, pro jejichž strany platí

$$\frac{y - y_A}{x - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (6.5)$$



Hodnotu výrazů v (6.5) nazýváme *směrnici přímky*. Označíme ji k a vyjádříme pomocí souřadnic bodů na přímce

$$k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (6.6)$$

Rovnici přímky pak můžeme zapsat ve tvaru


$$y = y_A + k(x - x_A) \quad (6.7)$$

Úlohy.

Ze vztahů (6.5), (6.6) odvoďte vztah (6.7).

Napište rovnici přímky procházející body $[2, 1]$, $[4, 5]$.

Výše jsme odvodili vztahy pro speciální polohu bodů. Na dalších obrázcích ukážeme, že odvozené vztahy platí i v obecné poloze.



Uvažujme bod $[x, y]$ vlevo od bodu $[x_A, y_A]$. Z podobnosti trojúhelníků dostaneme



$$\frac{y_A - y}{x_A - x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A},$$

což je ekvivalentní vztahu (6.5).

Úloha.

Uvažujte i další pořadí bodů A, B, X na přímce a ukažte, že vždy dostanete vztah ekvivalentní vztahu (6.5).

Rozebereme ještě příklad „klesající“ přímky, tedy případ $x_A < x_B, y_A > y_B$.



K nim jsou na obrázku vpravo zvoleny další dva body a čárkovaně dokresleny podobné trojúhelníky. Pro bod vlevo platí

$$\frac{y - y_A}{x_A - x} = \frac{y_A - y_B}{x_B - x_A},$$

pro bod vpravo

$$\frac{y_A - y}{x - x_A} = \frac{y_A - y_B}{x_B - x_A}.$$

Obě rovnosti lze vynásobením mínus jedničkou upravit na (6.5).

Poslední případ je $y_A = y_A$. Přímka je rovnoběžná s osou x a má rovnici $y = y_A$. Rozmyslete si, že tuto rovnici dostaneme jako speciální případ výše uvedených vztahů.

Závěr. Přímka určená dvěma různými body $A = [x_A, y_A]$, $B = [x_B, y_B]$ má v případě $x_A = x_B$ rovnici $x = x_A$ a v případě $x_A \neq x_B$ rovnici (6.7), kde za k dosadíme číslo vypočtené z (6.6).

6.3 Geometrický význam koeficientů


Odvodíme geometrický význam koeficientů a , b v rovnici $y = ax + b$.

Dosazením $x = 0$ dostaneme $y = b$. Proto protíná přímka o rovnici $y = ax + b$ osu y v bodě $[0, b]$.

Pro zjištění geometrického významu koeficientu a budeme potřebovat dva body přímky. Jejich souřadnice splňují rovnice $y_1 = ax_1 + b$, $y_2 = ax_2 + b$. Odečtením rovnic dostaneme $y_2 - y_1 = a(x_2 - x_1)$ a po další úpravě


$$a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) \quad (6.8)$$

tedy vztah (6.6), který jsme výše odvodili geometricky. Na následujících obrázcích ukážeme geometrický význam čísla a .




Na obrázku je vyznačen úhel φ v pravoúhlém trojúhelníku s tečkovanými odvěsnami a plnou přeponou. Ve vztahu (6.8) jsou v čitateli a jmenovateli velikosti odvěsen, odkud dostaneme

$$a = \operatorname{tg} \varphi$$



Protože přímka svírá s rovnoběžkami stejný úhel, dostáváme význam koeficientu u x : je roven tangentu úhlu, který svírá přímka s osou x .^a

^aPro přímku v obecné poloze je to úhel od kladné poloosy proti směru hodinových ručiček k přímce. V geometrii uvažujeme mezi přímkami vždy ostrý nebo pravý úhel, zde však záporné směrnici a odpovídá tupý úhel φ .



Ještě ukážeme význam koeficientu a v řeči přírůstků. Na obrázku jsme zvolili přírůstek proměnné x roven jedné. Koeficient a je pak roven odpovídajícímu přírůstku y . Zároveň jsme na ose y vyznačili absolutní člen b .

6.4 Graf lineární funkce

V předchozí kapitole jsme ukázali, že každá přímka má rovnici buď $x =$ konstanta nebo (6.7).

Úloha. Diskutujte, zda odtud plyne, že každá rovnice (6.7) je rovnice přímky.

Literatura

- [1] Jindřich Bečvář and Martina Bečvářová. Vývoj matematiky jako popularizující stimul.
www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/oppa/matematika_stimul_blok.pdf.
- [2] Jiří Veselý. Základy matematické analýzy.
www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma11-12/MA_I/ppma.pdf.

Rejstřík

funkce

- argument, 10
- elementární, 7
- funkční hodnota, 10
- graf, 8
- inverzní, 59
- klesající, 54
- kořen, 16
- lichá, 53
- obor hodnot, 54
- obraz, 10
- po částech lineární, 82
- přírůstek, 12
- prostá, 59
- rostoucí, 53
- rozšíření, 15
 - spojité, 15
- spojitá, 13
 - odstranitelná nespojitost, 18
- sudá, 52
- vzor, 10

odmocnina

- lichá, 58
- sudá, 58

přírůstek

- funkce, 12, 91
- proměnné, 12

spojitost funkce, 13

odstranitelná nespojitost, 18