

## Čtvrtá série úloh ze středoškolské matematiky pro studenty FP TUL

Cíl: Zopakovat výroky, logiku, matematický symbolický jazyk (tj. zápis výroků a množin). Poslední dvojice úloh propojuje symbolický matematický jazyk s neekvivalentními úpravami rovnic.

- 1a Pomocí tabulky pravdivostních hodnot zjistěte, zda je ekvivalentní výrok  $(a \vee \neg b) \wedge (\neg a \vee b)$  s výrokem  $(a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$ . (Symbol  $\neg$  označuje negaci, tedy  $\neg a$  značí negaci výroku  $a$ .)
- 1b Výrok:  $(a \Rightarrow b) \Rightarrow c$  s výrokem  $a \Rightarrow (b \Rightarrow c)$ .
- 1c Výrok  $\neg(a \Rightarrow b)$  s výrokem  $a \wedge \neg b$ .
- 1d Výrok  $(a \vee b) \wedge c$  s výrokem  $(a \wedge c) \vee (b \wedge c)$ .
2. Ukažte, že následující výroky jsou pravdivé pro jakékoli pravdivostní ohodnocení výroků  $a, b, c$

$$a \Rightarrow (b \Rightarrow a), \quad (a \Rightarrow (b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \Rightarrow (a \Rightarrow c))$$

3. Zapište pomocí jednoho výroku ( $a, \neg a, 1$  nebo  $0$ ) následující výroky:  $a \vee 1, a \wedge 1, a \vee 0, a \wedge 0, a \vee a, a \vee \neg a, a \wedge a, a \wedge \neg a$ . Symboly  $1$ , popřípadě  $0$ , označují pravdivý, popřípadě nepravdivý, výrok.<sup>1</sup>
- 4a Znegujte výroky a rozhodněte o jejich platnosti. Svůj závěr řádně zdůvodněte. Výroky i jejich negace napište slovy.
  - (a)  $(\exists x \in \mathbb{R})(x - 4 > 0)$
  - (b)  $(\forall x \in \mathbb{R})(\sin(x) \geq -1)$
- 4b
  - (a)  $(\exists x \in \mathbb{R})(\sin(x) > -1)$
  - (b)  $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq -1)$
- 5a Na reálné ose vyznačte množiny  $A, B$  a množiny  $A \cap B, A \cup B$

$$\begin{aligned}A &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x < 0\} \\B &= \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}\end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>Návod: přemýšlejte o významu uvedených logických spojek a pokud si nevíte rady, použijte tabulku pravdivostních hodnot.

5b

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 - x \leq 0\} \\ B &= \{x \in \mathbb{R} : |x| \geq 2\} \end{aligned}$$

5c

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 + 3x < 0\} \\ B &= \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 3\} \end{aligned}$$

6a Nalezněte všechna reálná čísla splňující

$$2x + 3 = \sqrt{3x + 7}$$

6b

$$x - 3 = \sqrt{3x^2 + 1}$$

6c

$$-x - 1 = \sqrt{x + 7}$$

7a Určete množiny  $A$ ,  $B$  a určete, které ze vztahů  $A = B$ ,  $A \subseteq B$ ,  $B \subseteq A$  platí.

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : 2x + 3 = \sqrt{3x + 7}\} \\ B &= \{x \in \mathbb{R} : (2x + 3)^2 = 3x + 7\} \end{aligned}$$

7b

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : x - 3 = \sqrt{3x^2 + 1}\} \\ B &= \{x \in \mathbb{R} : (x - 3)^2 = 3x^2 + 1\} \end{aligned}$$

7c

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : -x - 1 = \sqrt{x + 7}\} \\ B &= \{x \in \mathbb{R} : (-x - 1)^2 = x + 7\} \end{aligned}$$