

## Vlastnosti Riemannova a Newtonova integrálu

V dalším předpokládáme, že  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , v případě Newtonova integrálu připouštíme i  $a = -\infty$ ,  $b = +\infty$ . U Newtonova integrálu navíc předpokládáme, že nabývá konečných hodnot (pro Riemannův integrál je to samozřejmé).

- ▶ *Aditivita vzhledem k integračnímu oboru:* pro  $c \in (a, b)$  platí

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- ▶ *Aditivita vzhledem k integrované funkci:*

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

- ▶ *Linearita vzhledem k integrované funkci:* pro  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  platí

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

## Vlastnosti Riemannova a Newtonova integrálu – pokračování

- ▶ *Nezápornost integrálu*: pro funkci  $f$  nezápornou na intervalu  $[a, b]$ , tedy za předpokladu, že pro  $x \in [a, b]$  platí  $f(x) \geq 0$  je i integrál nezáporný, tedy  $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ .
- ▶ *Monotonie integrálu*: pro  $f \geq g$ , tedy za předpokladu, že pro  $x \in [a, b]$  platí  $f(x) \geq g(x)$  platí

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

- ▶ *Integrál z konstantní funkce*: pro  $k \in \mathbb{R}$  platí

$$\int_a^b k dx = k(b - a)$$

Zde pro případ  $b - a = +\infty$ ,  $k = 0$  definujeme  $0 \times \infty = 0$ .

## Poznámky:

- ▶ První tři vlastnosti (obě aditivity a linearita) platí za předpokladu, že má alespoň jedna strana smysl. Zpravidla je používáme tak, že spočítáme pravou stranu a prohlásíme ji za výsledek levé strany.
- ▶ Rozmyslete si, že aditivita vzhledem k integračnímu oboru platí i v případě  $c = a$  a  $c = b$  za předpokladu, že definujeme  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .
- ▶ Vyjádříte-li z pravé strany jeden z integrálů, například

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

dosáhneme formálně stejného tvaru jako vlastnost na předchozím slajdu, pokud definujeme  $\int_b^c f(x) dx = -\int_c^b f(x) dx$ .

- ▶ Aditivita vzhledem k integračnímu oboru je pro oba integrály přímočarým důsledkem jejich definice.

- ▶ Aditivita vzhledem k integrované funkci je pro Newtonův integrál přímočarým důsledkem jeho definice.
- ▶ Důkaz aditivity vzhledem k integrované funkci je pro Riemannův integrál méně přímočarý, věnujeme mu následující slajd.
- ▶ Linearita je pak pro oba integrály snadným důsledkem aditivity a definice integrálu. Rozmyslete si, že stačí ukázat

$$\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

- ▶ K aditivě Riemannova integrálu vzhledem k integrované funkci:

Z vlastností suprema a infima se odvodí nerovnosti

$$I_h(f + g, a, b) \leq I_h(f, a, b) + I_h(g, a, b)$$

$$I_d(f + g, a, b) \geq I_d(f, a, b) + I_d(g, a, b)$$

To, že v uvedených nerovnostech nemusí platit rovnost ukážeme volbou  $f = d$  (Dirichletova funkce),  $g = 1 - d$  (tedy 1 pro iracionální čísla a 0 pro racionální), pak je  $f + g = 1$ . V prvním vztahu máme  $1 \leq 2$ , ve druhém  $1 \geq 0$ .

Aditivitu pak dostaneme z nerovností

$$\begin{aligned} I_h(f, a, b) + I_h(g, a, b) &\geq I_h(f + g, a, b) \geq I_d(f + g, a, b) \geq \\ &\geq I_d(f, a, b) + I_d(g, a, b) \end{aligned}$$

a z předpokladu  $I_h(f, a, b) = I_d(f, a, b)$  a stejného vztahu pro funkci  $g$ .

- ▶ Pozitivita pro Newtonův integrál je procvičení základů diferenciálního počtu: je-li  $f$  nezáporná na  $[a, b]$  a  $F$  je její primitivní funkce, pak je  $F$  neklesající na  $[a, b]$ , a tedy  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$  a odtud plyne, že Newtonův integrál z  $f$  je na  $[a, b]$  nezáporný.
- ▶ Pozitivita pro Riemannův integrál: všechny dolní i horní součty jsou nezáporné, tedy i jejich supremum a infimum je nezáporné, a tedy i Riemannův integrál je nezáporný.
- ▶ Monotonie plyne pro oba integrály linearitou a z monotonie: je-li  $f \geq g$  na  $[a, b]$ , pak je  $f - g \geq 0$  na  $[a, b]$ , z monotonie je pak  $\int_a^b f - g \geq 0$ , z linearitou  $\int_a^b f - g = \int_a^b f - \int_a^b g$  a odtud  $\int_a^b f \geq \int_a^b g$ .

