

Úlohy na cvičení z Matematické analýzy 3

15. října 2024

Poznámka: úlohy 1 až 12 jsou zopakovány z minula. Přitom úlohy 5a, b, 9 jsou mírně pozměněné.

Úlohy 13 až 16 jsou na Taylorovy řady. Doporučuji podívat se na Taylorovy polynomy, které jsme probírali minulý semestr.

Následují úlohy 17 až 24 na metrické prostory.

1* Vysvětlete proč pro $M \subset \mathbb{R}$ a funkce f_n, f platí implikace

$$(f_n \Rightarrow f \text{ na } M) \implies (f_n \rightarrow f \text{ na } M)$$

Tedy ze stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí na množině M plyne bodová konvergence.

2* Vysvětlete proč pro $M \subset \mathbb{R}$ a funkce f_n, f platí ekvivalence

$$(f_n \Rightarrow f \text{ na } M) \iff (\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in M} |f_n(x) - f(x)| = 0)$$

Tedy, že nutnou a postačující podmínkou stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí na množině M je nulová limita suprema výrazu $|f_n(x) - f(x)|$ na množině M .

3. Vysvětlete, že pro funkce f_n, f spojité na uzavřeném intervalu $[a, b]$ je možné supremum

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|$$

nahradit maximem

$$\max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|$$

a že toto maximum lze nahradit větším z čísel

$$|\max_{x \in [a, b]} (f_n(x) - f(x))|, \quad |\min_{x \in [a, b]} (f_n(x) - f(x))|$$

4. Mocninná řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ má poloměr konvergence $r > 0$. Kladné číslo ε je menší než r . Označme $b_n = a_n(r - \varepsilon/2)^n$.

Ukažte, že $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

5a Sečtěte řadu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{5^n}$$

5b

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$$

5c

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$$

5d

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

6. Ukažte, že pro libovolnou dvojici reálných čísel x, y platí

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Návod: Uvažujte všechny případy $x \geq 0, x < 0, y \geq 0, y < 0, x+y \geq 0, x+y < 0$, které rovinu xy rozdělí na šest částí.

7. Ukažte, že pro každou trojici reálných čísel x, y, z platí $|z - x| \leq |y - x| + |z - y|$.

Návod: proberte všechna možná pořadí bodů na číselné ose.

Návod2: použijte výsledek předchozí úlohy.

8. Zjistěte, zda (\mathbb{R}, ϱ_2) je metrický prostor, kde

$$\varrho_2(x, y) = (x - y)^2$$

9. Zjistěte, zda $(\mathbb{R}, \varrho_{1/3})$ je metrický prostor, kde

$$\varrho_{1/3}(x, y) = \sqrt[3]{|x - y|}$$

10. Zjistěte, zda $(\mathbb{R}, \varrho_{diskr})$ je metrický prostor, kde

$$\varrho_{diskr}(x, y) = 1 \text{ pro } x \neq y$$

11. Ukažte, že pro každou čtverici čísel $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ platí

$$\sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}$$

Dosazením $a = y_1 - x_1, b = y_2 - x_2, c = z_1 - y_1, d = z_2 - y_2$ dostaneme v závěru přednášky dokazovanou trojúhelníkovou nerovnost.

12a Vypočtěte limity

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} x^n \right), \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \right)$$

12b

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \exp(-nx^2) \right), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \exp(-nx^2) \right)$$

12c Nechť $f_n(x) = \frac{x}{\exp(nx^2)}$ je posloupnost funkcí. Vypočtěte derivaci f'_n a bodové limity posloupnosti f_n i f'_n . Dále určete, zda pro $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)'$$

13. Taylorova řada funkce f se středem v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ je mocninná řada se středem v bodě x_0 a koeficienty $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

Napište Taylorovy řady funkcií exp, sin, cos se středem v bodě nula a ukažte, že konvergují pro $x \in \mathbb{R}$.

14 Odvod'te koeficienty Taylorovy řady funkce $f(x) = (1+x)^\alpha$ pro $\alpha \in \mathbb{R}$ a určete její polomér konvergence.

15* Odvod'te koeficienty Taylorovy řady funkce $f(x) = 1/(1-x^2)$ a určete její polomér konvergence.

16a* Vypočtěte derivaci funkce f v bodě $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-1/x^2) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

16b* Vypočtěte $f''(0)$.

16c* Vypočtěte $f^{(3)}(0)$.

16d** Odvod'te Taylorovu řadu funkce f se středem v bodě nula.

17. Nechť $(V, \|\cdot\|)$ je normovaný lineární prostor. Ukažte, že (V, ϱ) , kde $\varrho(x, y) = \|x - y\|$ je metrický prostor.

18. Ukažte, že $\|(x_1, x_2)\|_{l^1} := |x_1| + |x_2|$ je normou na \mathbb{R}^2 .

19* Ukažte, že $\|(x_1, x_2)\|_{\max} := \max\{|x_1|, |x_2|\}$ je normou na \mathbb{R}^2 .

20. Ukažte, že euklidovská norma splňuje axiomy (N1), (N2) normy.

21. Odvodte a nakreslete jednotkovou kouli se středem v počátku v \mathbb{R}^2 v maximové metrice.

22* Ukažte, že v metrickém prostoru s metrikou ϱ jsou ekvivalentní výroky

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \varrho(x_n, x) = 0$$

23. Použijte předchozí cvičení k důkazu, že v metrickém prostoru $(\mathbb{R}^2, \varrho_{eukl})$ je limita posloupnosti $x_n = (1/(n+1), (-1)^n/(n^2+1))$ rovna $o = (0, 0)$. Tj. vypočtěte limitu číselné posloupnosti a ukažte, že je rovna nule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varrho(x_n, o)$$

24. Ukažte, že v metrickém prostoru $(\mathbb{R}, \varrho_{eukl})$ je

- (a) otevřený interval (a, b) otevřená množina,
- (b) uzavřený interval $[a, b]$ uzavřená množina.