

Úvod do funkcí komplexní proměnné

Metodický a výkladový text pro studenty učitelství matematiky

Martina Šimůnková ve spolupráci s LLM Gemini, model 3.6 thinking

Abstract

Tento učební text slouží jako úvodní kapitola do studia komplexní analýzy určená pro budoucí učitele matematiky. Klade si za cíl překlenout tradiční kognitivní bariéru při zavádění komplexních čísel. Namísto formálního postulování zavedení „pomyslné“ imaginární jednotky staví výklad na přirozeném izomorfismu mezi komplexními čísly a reálným vektorovým prostorem $\mathbb{R}^2$, geometrické interpretaci lineárních zobrazení a zavedení součinu prostřednictvím rovinných rotací.

Contents

1	Komplexní čísla jako vektorový prostor $\mathbb{R}^2$	2
1.1	Algebraický izomorfismus $(\mathbb{C}, +, \cdot, \mathbb{R})$ a $\mathbb{R}^2$	2
1.2	Geometrický význam základních zobrazení v $\mathbb{C}$	3
1.3	Řešené a neřešené úlohy	4
2	Normovaný prostor a absolutní hodnota	4
2.1	Izomorfismus normovaných prostorů	4
2.2	Trojúhelníková nerovnost	5
3	Metrika, limita a spojitost v $\mathbb{C}$	6
3.1	Odvození metriky	6
3.2	Limita a spojitost	7
3.3	Komplexní sdružování a jeho spojitost	7
4	Přidání násobení dvou komplexních čísel	8
4.1	Standardní algebraický přístup	8
4.2	Geometrický přístup (Axiomatika přes otočení v rovině)	8
5	Závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi	9

1 Komplexní čísla jako vektorový prostor $\mathbb{R}^2$

Při výuce na střední i vysoké škole se často setkáváme s tím, že zavádění komplexních čísel způsobuje u studentů kognitivní šok. Tradiční přístup často začíná deklarací: „Zavedeme číslo i , pro které platí $i^2 = -1$.“ Pro mnoho žáků a studentů však zůstává takové číslo abstraktním a nepřírozeným objektem.

Jako budoucí učitelé matematiky bychom měli hledat cesty, jak matematické struktury motivovat na základě konceptů, které studenti již dobře znají. Jedním z nejpřirozenějších přístupů je nahlížet na komplexní čísla primárně jako na prvky dvourozměrného reálného vektorového prostoru.

1.1 Algebraický izomorfismus $(\mathbb{C}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$ a $\mathbb{R}^2$

Uvažujme množinu uspořádaných dvojic reálných čísel $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$. Z lineární algebry víme, že $\mathbb{R}^2$ tvoří spolu s operacemi sčítání po složkách a násobení reálným skalárem reálný vektorový prostor.

Definujme na množině $\mathbb{C}$ operace sčítání dvou komplexních čísel a násobení komplexního čísla reálným číslem:

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \\ r \cdot (x + iy) = (rx) + i(ry), \quad \text{kde } r \in \mathbb{R}.$$

Struktura $(\mathbb{C}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$ tvoří reálný vektorový prostor dimenze 2. Zobrazení

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, \quad \Phi(x, y) = x + iy$$

je zjevně bijektivní a zachovává operace sčítání i násobení reálným skalárem. Tedy algebraické struktury $(\mathbb{C}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$ a $(\mathbb{R}^2, +, \cdot_{\mathbb{R}})$ jsou **izomorfní**.

V kanonické bázi $e_1 = (1, 0)$ a $e_2 = (0, 1)$ prostoru $\mathbb{R}^2$ odpovídají bázevým vektorům komplexní jednotky:

$$\Phi(e_1) = \Phi(1, 0) = 1, \quad \Phi(e_2) = \Phi(0, 1) = i.$$

Každý prvek $z \in \mathbb{C}$ tak představuje jednoznačnou lineární kombinaci $z = x \cdot 1 + y \cdot i$. Geometricky tak komplexní číslo reprezentujeme jako bod nebo vektor v tzv. **Gaussově rovině** (viz obrázek 1).




Figure 1: Gaussova rovina jako izomorfní obraz reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^2$.

Didaktická poznámka pro budoucí učitele:

Představení komplexních čísel prostřednictvím izomorfismu s $\mathbb{R}^2$ eliminuje pocit „tajemna“. Žáci na střední škole již mají zkušenost s vektory v rovině. Sčítání komplexních čísel pak není nic jiného než rovnoběžníkové pravidlo pro sčítání vektorů a reálný násobek představuje změnu délky (a případně změnu orientace) vektoru.

1.2 Geometrický význam základních zobrazení v $\mathbb{C}$

Díky izomorfismu s $\mathbb{R}^2$ můžeme jednoduchá algebraická zobrazení v $\mathbb{C}$ interpretovat jako známá geometrická zobrazení v rovině:

1. **Translace (posunutí):** Zobrazení $w = f(z) = z + c$, kde $c = c_1 + ic_2 \in \mathbb{C}$ je konstanta.

Přepíšeme-li toto zobrazení do složek $z = x + iy$ a $w = u + iv$, dostáváme:

$$u + iv = (x + c_1) + i(y + c_2) \iff \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Jde o posunutí (translaci) roviny o vektor $\vec{v} = (c_1, c_2)$.

2. **Stejnolehlost se středem v počátku:** Zobrazení $w = g(z) = r \cdot z$, kde $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ve složkách platí $(u, v) = (rx, ry)$. Toto zobrazení odpovídá stejnohlosti (homotetii) se středem v počátku $[0, 0]$ a koeficientem r . Pro $r > 0$ jde o zvětšení/zmenšení, pro $r < 0$ jde o stejnohlost spojenou se středovou souměrností.

3. **Složená zobrazení (posunutá stejnohlost):** Zobrazení $w = h(z) = r \cdot z + c$, kde $r \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ a $c \in \mathbb{C}$.

Zkoumejme, zda má toto zobrazení pevný bod, tj. bod $S \in \mathbb{C}$, pro který platí $h(S) = S$:

$$S = r \cdot S + c \implies S(1 - r) = c \implies S = \frac{c}{1 - r}.$$

Dosadíme-li $c = S(1 - r)$ do původního předpisu zobrazení, získáme:

$$w = rz + S(1 - r) \implies w - S = r(z - S).$$

Tento tvar má jasnou geometrickou interpretaci: vektor $w - S$ je r -násobkem vektoru $z - S$. Zobrazení $w = rz + c$ tedy představuje **stejnolehlost se středem $S = \frac{c}{1-r}$ a koeficientem r** (viz obrázek 2).




Figure 2: Posunutá stejnohlost $w = rz + c$ vyjádřená jako $w - S = r(z - S)$.

1.3 Řešené a neřešené úlohy

Příklad 1.1. Sestavte rovnici stejnolehlosti v Gaussově rovině, která má střed $S = 2 - i$ a koeficient stejnolehlosti $r = -3$.

Řešení. Využijeme tvar $w - S = r(z - S)$. Dosazením zadaných hodnot dostáváme:

$$w - (2 - i) = -3(z - (2 - i)).$$

Rovnici upravíme do standardního tvaru $w = rz + c$:

$$w = -3z + 3(2 - i) + (2 - i)$$

$$w = -3z + 4(2 - i)$$

$$w = -3z + 8 - 4i.$$

Hledaná rovnice zobrazení je $w = -3z + 8 - 4i$. □

Příklad 1.2. Je dáno zobrazení v $\mathbb{C}$ předpisem $w = 2z + 3 - 4i$. Určete geometrický typ tohoto zobrazení a jeho charakteristické parametry.

Řešení. Koeficient u z je reálné číslo $r = 2 \neq 1$. Jedná se tedy o posunutou stejnolehlost s koeficientem $r = 2$. Střed S určíme jako pevný bod zobrazení:

$$S = 2S + 3 - 4i \implies -S = 3 - 4i \implies S = -3 + 4i.$$

Zobrazení je stejnolehlost se středem $S = -3 + 4i$ a koeficientem $r = 2$. □

Cvičení 1.1. Určete rovnici stejnolehlosti se středem $S = -1 + 2i$ a koeficientem $r = \frac{1}{2}$.
[Výsledek: $w = \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} + i$]

Cvičení 1.2. Určete geometrický typ a parametry zobrazení $w = -z + 4 + 2i$. [Výsledek: Stejnolehlost se středem $S = 2 + i$ a koeficientem $r = -1$, což je středová souměrnost podle bodu S .]
—

2 Normovaný prostor a absolutní hodnota

Aparát samotného vektorového prostoru nám umožňuje body sčítat a násobit reálným číslem, ale neříká nic o vzdálenostech a úhlech. Abychom mohli budovat matematickou analýzu (limity, spojitost), potřebujeme zavést metriku a normu.

2.1 Izomorfismus normovaných prostorů

V reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ je standardní euklidovská norma definována vztahem:

$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

V komplexních číslech definujeme **absolutní hodnotu** čísla $z = x + iy$ jako reálné číslo:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Z definice je zřejmé, že pro izomorfismus $\Phi(x, y) = x + iy$ platí:

$$\|\vec{v}\| = |\Phi(\vec{v})|.$$

Struktury $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$ a $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ jsou tedy izomorfní jako normované vektorové prostory. Geometricky $|z|$ představuje vzdálenost bodu z od počátku v Gaussově rovině.

2.2 Trojúhelníková nerovnost

Jednou z nejdůležitějších vlastností normy je trojúhelníková nerovnost. Ukažme si její odvození jednak v $\mathbb{R}^2$ úpravou složek, jednak v $\mathbb{C}$ pomocí algebraických vlastností komplexních čísel a oba postupy porovnejme.

Věta 2.1 (Trojúhelníková nerovnost). *Pro libovolná $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ platí:*

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

1. Důkaz v $\mathbb{R}^2$ úpravou složkových výrazů: Nechť $z_1 = x_1 + iy_1 \equiv (x_1, y_1)$ a $z_2 = x_2 + iy_2 \equiv (x_2, y_2)$. Chceme dokázat dokazovanou nerovnost ve tvaru:

$$\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

Jelikož jsou obě strany nerovnosti nezáporné, umocněním na druhou získáme ekvivalentní nerovnost:

$$(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \leq (x_1^2 + y_1^2) + 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2} + (x_2^2 + y_2^2).$$

Roznásobením výrazů na levé straně dostáváme:

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2 \leq x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

Odečtením společných členů $x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2$ z obou stran a vydělením číslem 2 obdržíme:

$$x_1x_2 + y_1y_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

Je-li levá strana $x_1x_2 + y_1y_2 \leq 0$, nerovnost platí triviálně, neboť pravá strana je nezáporná. Je-li $x_1x_2 + y_1y_2 > 0$, umocníme obě strany opět na druhou:

$$(x_1x_2 + y_1y_2)^2 \leq (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2).$$

Roznásobením obou stran obdržíme:

$$x_1^2x_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 + y_1^2y_2^2 \leq x_1^2x_2^2 + x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2.$$

Odečtením členů $x_1^2x_2^2$ a $y_1^2y_2^2$ získáme:

$$2x_1x_2y_1y_2 \leq x_1^2y_2^2 + y_1^2x_2^2,$$

což je po převedení všech členů na jednu stranu ekvivalentní s:

$$0 \leq x_1^2y_2^2 - 2x_1y_2y_1x_2 + y_1^2x_2^2 = (x_1y_2 - y_1x_2)^2.$$

Tato nerovnost je vždy splněna, neboť druhá mocnina reálného čísla je nezáporná. Zpětným postupem po ekvivalentních úpravách je důkaz v $\mathbb{R}^2$ dokončen.

2. Důkaz v $\mathbb{C}$ pomocí komplexního sdružení: Uvažujme kvadrát absolutní hodnoty součtu. S využitím vztahu $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ (kde $\bar{z} = x - iy$ je komplexně sdružené číslo) máme:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\ &= z_1\bar{z}_1 + z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 \\ &= |z_1|^2 + (z_1\bar{z}_2 + \overline{z_1\bar{z}_2}) + |z_2|^2. \end{aligned}$$

Pro libovolné komplexní číslo w platí $w + \bar{w} = 2\operatorname{Re}(w) \leq 2|w|$. Tedy:

$$z_1\bar{z}_2 + \overline{z_1\bar{z}_2} = 2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) \leq 2|z_1\bar{z}_2| = 2|z_1||\bar{z}_2| = 2|z_1||z_2|.$$

Dosazením zpět získáme:

$$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2.$$

Jelikož jsou obě strany nerovnosti nezáporné, odmocněním dostáváme $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$. $\square$

Porovnání obou postupů:

- **Složkový postup v $\mathbb{R}^2$:** Využívá výhradně reálnou algebru. Je didakticky cenný tím, že staví na znalostech ze střední školy (umocňování, úprava na čtverec). Je však algebraicky zdoluhavý, vyžaduje opatrnost při umocňování nerovností a zakrývá přirozený geometrický nadhled.
- **Komplexní postup v $\mathbb{C}$:** Využívá vlastností komplexně sdružených čísel a absolutní hodnoty. Důkaz je velmi krátký, elegantní a přímočarý. Výraz $2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2)$ v tomto postupu přímo odpovídá dvojnásobku skalárního součinu vektorů $\vec{u} \cdot \vec{v}$, čímž elegantně obchází zdoluhavou úpravu na čtverec.

Otázka k zamyšlení:

Všimněte si, že algebraický krok $2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) \leq 2|z_1||z_2|$ přesně odpovídá Cauchyově-Schwarzově nerovnosti $\vec{u} \cdot \vec{v} \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ v $\mathbb{R}^2$. v čem spočívá výhoda algebraického zápisu v $\mathbb{C}$ oproti zápisu ve složkách v $\mathbb{R}^2$?

—

3 Metrika, limita a spojitost v $\mathbb{C}$

3.1 Odvození metriky

Každá norma indukuje metriku (vzdálenost mezi dvěma body). Pro libovolná $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ definujeme metriku předpisem:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Díky metrice můžeme zavést pojem ε -okolí bodu z_0 :

$$U_\varepsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}.$$

Geometricky je $U_\varepsilon(z_0)$ otevřený kruh se středem z_0 a poloměrem $\varepsilon > 0$.

3.2 Limita a spojitost

Definice limity a spojitosti pro funkce komplexní proměnné $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je formálně totožná s definicí známou z reálné analýzy.

Definice 3.1 (Spojitost v bodě). Řekneme, že funkční zobrazení $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je **spojité v bodě** $z_0 \in \mathbb{C}$, jestliže ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro všechna $z \in \mathbb{C}$ splňující $|z - z_0| < \delta$ platí:

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

Ověřme spojitost základních lineárních zobrazení:

1. Translace $f(z) = z + c$:

$$|f(z) - f(z_0)| = |(z + c) - (z_0 + c)| = |z - z_0|.$$

Stačí volit $\delta = \varepsilon$. Translace zachovává vzdálenosti (je to izometrie), a tedy je spojitá na celém $\mathbb{C}$.

2. Stejnolehlost $g(z) = rz$ ($r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$):

$$|g(z) - g(z_0)| = |rz - rz_0| = |r| \cdot |z - z_0|.$$

Pro dané $\varepsilon > 0$ stačí zvolit $\delta = \frac{\varepsilon}{|r|}$. Stejnolehlost je tedy spojitá na $\mathbb{C}$.

3.3 Komplexní sdružování a jeho spojitost

Definujme zobrazení komplexního sdružování $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ předpisem $f(z) = \bar{z}$. Pro $z = x + iy$ je $\bar{z} = x - iy$.

Geometricky představuje toto zobrazení **osovou souměrnost podle reálné osy** (viz obrázek 3).




Figure 3: Komplexní sdružování $z \mapsto \bar{z}$ jako osová souměrnost.

Ukažme spojitost tohoto zobrazení. Platí:

$$|f(z) - f(z_0)| = |\bar{z} - \bar{z}_0| = |\overline{z - z_0}| = |z - z_0|.$$

Jelikož je vzdálenost obrazů rovna vzdálenosti vzorů, jde opět o izometrii. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ stačí položit $\delta = \varepsilon$. Funkce $f(z) = \bar{z}$ je tedy spojitá v každém bodě $z_0 \in \mathbb{C}$.

4 Přidání násobení dvou komplexních čísel

Doposud jsme pracovali s $\mathbb{C}$ pouze jako s vektorovým prostorem vybaveným sčítáním a násobením reálným číslem. Nyní se dostáváme k zásadnímu kroku: zavedení **součinu dvou komplexních čísel**.

Porovnejme dva možné didaktické přístupy k zavedení součinu.

4.1 Standardní algebraický přístup

Při algebraickém přístupu postulujeme existenci prvku i s vlastností $i^2 = -1$ a požadujeme, aby násobení bylo distributivní vůči sčítání a komutativní:

$$\begin{aligned}(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) &= x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 \\ &= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).\end{aligned}$$

Nevýhodou tohoto přístupu je, že pravidlo $(x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$ působí na první pohled uměle a zůstává neodůvodněno, proč by operace násobení měla vypadat právě takto.

4.2 Geometrický přístup (Axiomatika přes otočení v rovině)

Přístup založený na geometrii v $\mathbb{R}^2$ nabízí mnohem hlubší vhled.

Zkoumejme lineární zobrazení $R_{90^\circ} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, které představuje **otočení (rotaci) vektoru o 90° v kladném směru** (proti směru hodinových ručiček).

Pro libovolný vektor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dostáváme po otočení o 90° vektor $(-y, x)$.




Figure 4: Geometrická interpretace násobení jednotkou i jako otočení o $+90^\circ$.

Ptejme se: Jaký algebraický význam má toto zobrazení? Ztotožňeme operaci otočení o 90° s vynásobením speciálním prvkem, který označíme i :

$$i \cdot (x, y) = (-y, x).$$

Provedeme-li dvě taková otočení po sobě (což odpovídá otočení o 180°), dostáváme:

$$i \cdot (i \cdot (x, y)) = i \cdot (-y, x) = (-x, -y) = -(x, y).$$

Požadujeme-li přirozenou vlastnost asociativity násobení $i \cdot (i \cdot z) = (i \cdot i) \cdot z = i^2 \cdot z$, dostáváme:

$$i^2 \cdot (x, y) = -(x, y) \implies i^2 = -1.$$

Vztah $i^2 = -1$ tedy není tajemným axiomem, ale **přímým algebraickým důsledkem geometrického faktu, že dvě otočení o 90° dají otočení o 180° (tj. zobrazení $z \mapsto -z$)!**

Nyní přímo z geometrické definice násobení jednotkou i jako otočení o 90° v kladném směru dostáváme pro libovolné číslo $z = x + iy \equiv (x, y)$:

$$i \cdot (x + iy) = -y + ix.$$

Didaktická poznámka pro budoucí učitele:

Všimněme si, že v tomto kroku nepotřebujeme mezikrok s roznásobováním závorky. Násobení jednotkou i je od počátku definováno jako geometrická operace rotace. Pokud bychom však výraz $i \cdot (x + iy)$ roznásobili podle běžných algebraických pravidel s využitím již odvozeného vztahu $i^2 = -1$, dostali bychom:

$$i \cdot (x + iy) = i \cdot x + i^2 \cdot y = ix + (-1)y = -y + ix.$$

Oba přístupy — geometrický i algebraický — dávají identický výsledek, což potvrzuje vnitřní konzistenci zavedené algebry.

Tento tvar geometricky potvrzuje: Vynásobení čísla z jednotkou i otočí vektor z o 90° v kladném směru.

Aplikujeme-li distributivitu pro obecná dvě čísla $z_1 = a + ib$ a $z_2 = x + iy$:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + ib)(x + iy) = a(x + iy) + b(i(x + iy)) \\ &= a(x + iy) + b(-y + ix) \\ &= (ax - by) + i(ay + bx). \end{aligned}$$

Didaktická poznámka pro budoucí učitele:

Pohled dopředu (goniometrický a exponenciální tvar):

Později v kurzu odvodíme goniometrický a exponenciální tvar komplexního čísla ($z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$) a ukážeme, že geometrická interpretace násobení platí zcela obecně: při násobení dvou komplexních čísel $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ a $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ se **jejich velikosti násobí** ($r = r_1 r_2$) a **jejich úhly (argumenty) sčítají** ($\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$). Násobení komplexním číslem tak v rovině nepředstavuje nic jiného než složení dvou základních geometrických zobrazení: stejnolehlosti s koeficientem r a rotace o úhel φ .

5 Závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi

V této kapitole jsme ukázali, že komplexní čísla nemusíme zavádět formálním postulátem o existenci kořenu rovnice $x^2 + 1 = 0$. Mnohem efektivnější didaktická cesta vede přes následující posloupnost kroků:

1. Startujeme od vektorového prostoru $\mathbb{R}^2$, který studenti dobře znají.
2. Zavedeme sčítání a reálné násobení, čímž získáme strukturu $(\mathbb{C}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$.
3. Interpretujeme posunutí a stejnolehlost jako základní lineární operace v Gaussově rovině.
4. Pomocí euklidovské normy zavedeme absolutní hodnotu, metriku a pojmy limity a spojitosti.
5. Násobení v $\mathbb{C}$ motivujeme geometricky jako rotaci v rovině, ze které přirozeně vyplýne vztah $i^2 = -1$.

Tento didaktický model poskytuje budoucím učitelům pevný základ pro to, aby dokázali komplexní čísla na středních i vysokých školách vyučovat názorně, smysluplně a s důrazem na geometrickou intuici.